Lunos®

Lunos® Fluoridlack
Lunos® Fluoride Varnish

CE 0124

+4°C / +23°C

OR 6000 1267 0316 99201604

Dorochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Str. 27, 70806 Kornwestheim
Vertrieb / Distribution: DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Tel: +49 7142 705-0
Fax: +49 7142 705-500
info@duerr.de · www.duerr.de
Made in Germany

DÜRR DENTAL

DE Gebrauchsanweisung
Lunos® Fluoridlack

mit 22600 ppm Fluorid / 1 ml enthält 50 mg Natriumfluorid (REF: CPZ030A0150)

Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung für die Behandlung von Schmelz- und Dentinoberflächen. Der Fluoridlack haftet an feuchten Oberflächen und toleriert Reste von Feuchtigkeit und Speichel. Er basiert auf einer ethanolischen Suspension aus Kolophonium mit künstlichem Aroma und Xylitol.

Achtung
Der Fluoridlack ist ein Medizinprodukt. Dieses Produkt ist nur für die professionelle zahnärztliche Anwendung bestimmt und darf ausschließlich von Fachpersonal angewendet werden!

Indikationen
Der Fluoridlack dient der Behandlung und dem Schutz von hypersensiblen Zähnen und zur Versiegelung von Dentintubuli bei Kavitätenpräparationen oder empfindlichen Wurzeloberflächen.

Warnhinweise
Der Fluoridlack enthält Kolophonium. Bei bekannten Überempfindlichkeiten (Allergien) gegen diesen Inhaltsstoff von Fluoridlack ist auf die Anwendung zu verzichten. Kolophonium kann die Polymerisation und die Haftung von Compositen beeinträchtigen. Seinem Anwendungszweck entsprechend hat der Fluoridlack eine klebrige Konsistenz. Bei Verwendung der Tube können Materialreste auf dem Schraubgewinde zur Verklebung des Deckels führen. Ggf. Verunreinigungen mit einem ethanolhaltigen Tuch abwischen. Der Fluoridlack ist nicht anzuwenden bei Patienten mit ulzerierenden Zahnfleisch- oder Mundschleimhautentzündungen. Der Fluoridlack ist nicht für die systemische Behandlung bestimmt. Selten wurde über ödematöse Schwellungen, besonders nach Anwendung auf größeren Oberflächen, berichtet. Bei vergleichbaren Präparaten wurde sehr selten über Ödeme bei Kindern mit Asthma berichtet. Bei Patienten mit empfindlichem Verdauungssystem kann nach umfangreicher Behandlung Übelkeit auftreten. Bei Überempfindlichkeit: Lack mit weicher Zahnbürste und Zahnseide entfernen, anschließend mit warmem Wasser spülen.

Vorsichtsmaßnahmen
Am Tag der Behandlung keine weiteren Anwendungen mit fluoridhaltigen Präparaten vornehmen. Die Einnahme von Fluoridtabletten nach Behandlung mit dem Fluoridlack einige Tage aussetzen. Lack nicht verschlucken.

Dosierung
Behandlung von Patienten mit Milchgebiss ca. 0,25 ml Fluoridlack.
Behandlung von Patienten mit Wechselgebiss oder bleibendem Gebiss ca. 0,40 ml Fluoridlack.
Einen dünnen Film Fluoridlack auf die Zahnhartsubstanz auftragen. Ein dicker Film löst sich leicht ab und bietet keine therapeutischen Vorteile. Erfahrungsgemäß liegt der benötigte Bedarf für ein komplettes Gebiss zwischen 0,25 ml und 0,40 ml.

Anwendung
Behandlungsfläche gründlich von Zahnstein reinigen.
Für ein besseres Ergebnis, überschüssige Feuchtigkeit/Speichel komplett von der zu behandelnden Fläche entfernen.
Den Fluoridlack gleichmäßig auftragen, so dass die komplette Oberfläche mit einem dünnen Film bedeckt ist.
Anwendungsbereich befeuchten (entweder durch leichte Spülung oder durch natürlichen Speichelfluss), um eine Abbindung des Fluoridlacks zu gewährleisten.
Patienten müssen darauf hingewiesen werden, 4 Stunden nach der Behandlung feste Nahrung, Alkohol, das Reinigen der Zähne sowie das Benutzen von Zahnseide zu vermeiden.

Lagerung und Haltbarkeit
Lagerung bei 4°C - 23°C. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL AUSTRIA, Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43.512572834
Vertrieb in Schweiz: DÜRR DENTAL AG, Seestraße 108, 9326 Horn, Switzerland
☎ +41 718441030

EN Operating Instructions
Lunos® Fluoride Varnish

with 22600 ppm fluoride / 1 ml contains 50 mg sodium fluoride (REF: CPZ030A0150)

Varnish containing fluoride for tooth desensitisation for the treatment of enamel and dentine surfaces. Fluoride Varnish adheres to moist surfaces and tolerates residues of moisture and saliva. It is based on an ethanolic suspension of colophony with artificial aromas and xylitol.

Warning
Fluoride Varnish is a medical product. This product is only intended for professional dental applications and must only be used by trained specialists!

Indications
Fluoride Varnish is used for the treatment and protection of hypersensitive teeth and to seal dentinal tubules during cavity preparations or sensitive root surfaces.

Warnings
Fluoride Varnish contains colophony. Do not use this product in cases of known hypersensitivity (allergies) to this ingredient of Fluoride Varnish. Colophony can impair the polymerisation and adhesion of composites. In line with its intended purpose, Fluoride Varnish has a sticky consistency. When the tube is used, material residue on the screw thread can cause the lid to stick. If necessary, wipe off any contamination with a cloth containing ethanol. Fluoride Varnish should not be used on patients suffering from ulcerative gums or inflammation of the oral mucosa. Fluoride Varnish is not intended for systemic treatment. In rare cases oedematous swelling has been reported, particularly after application to larger areas. On comparable products there have been very rare reports of shortness of breath in children suffering from asthma. Nausea may occur in patients with a sensitive digestive system after extensive treatment. In cases of hypersensitivity: remove the varnish with a soft toothbrush and dental floss, then rinse with warm water.

Precautionary measures
Do not carry out any other treatments with preparations containing fluoride on the day of treatment.
Do not take fluoride tablets for a few days after the treatment with Fluoride Varnish.
Do not swallow the varnish.

Dosage
Treatment of patients with milk teeth: approx. 0.25 ml Fluoride Varnish.
Treatment of patients with mixed dentition or permanent teeth: approx. 0.40 ml Fluoride Varnish.
Apply a thin film of Fluoride Varnish to the tooth structure. A thick film will detach easily and offers no therapeutical advantages. Empirically the requirements for a complete set of teeth are between 0.25 ml and 0.40 ml.

Application
Thoroughly clean any tartar from the treatment area.
For improved results completely remove any excess moisture/saliva from the surface under treatment.
Apply Fluoride Varnish evenly so that the entire surface is coated with a thin film.
Moisten the application area (either through light rinsing or natural saliva flow) to ensure bonding of the Fluoride Varnish.
Patients should be advised to avoid eating solid food, drinking alcohol, cleaning their teeth or using dental floss for a period of 4 hours after treatment.

Storage and shelf life
Storage at 4°C - 23°C. Do not use the product after its expiry date.

DÜRR DENTAL (Products) UK Ltd.
14 Linnwell Way – Telford Way Industrial Estate
Kettering, Northants NN16 8PS, United Kingdom ☎ +44 1536526740

FR Notice d'utilisation
Lunos® Vernis fluoré

avec 22600 ppm de fluorure / 1 ml contient 50 mg de fluorure de sodium (RÉF: CPZ030A0150)

Vernis fluoré pour la désensibilisation dentaire en vue du traitement de surfaces émaillées et dentinaires. Le vernis fluoré adhère aux surfaces humides et tolère les résidus d'humidité et de salive. Il est basé sur une suspension éthanolique à base de colophane avec un arôme artificiel et du xylitol.

Attention
Le vernis fluoré est un produit médical. Ce produit est uniquement destiné à un usage professionnel en médecine dentaire et doit être appliqué exclusivement par un personnel qualifié !

Indications
Le vernis fluoré sert au traitement et à la protection de dents hypersensibles, ainsi qu'au scellement de tubulis dentinaires dans le cadre de préparations de cavités ou de surfaces radiculaires sensibles.

Avertissements
Le vernis fluoré contient du colophane. En cas d'hypersensibilités connues (allergies) à ce composant du vernis fluoré, il convient d'éviter l'application. Le colophane peut gêner la polymérisation et l'adhérence des composites. Conformément à l'usage pour lequel il est prévu, le vernis fluoré a une consistance gluante. Lors de l'utilisation du tube, des résidus de matière sur le pas de vis du bouchon peuvent entraîner un collage de celui-ci. Le cas échéant, essuyer les salissures avec un chiffon imbibé d'éthanol. Le vernis fluoré ne doit pas être utilisé sur des patients ayant des stomatites ulcéreuses de la muqueuse buccale ou de la gencive. Le vernis fluoré n'est pas destiné à un traitement systémique. De rares cas de tuméfaction oedémateuse ont été rapportés, notamment après un traitement sur de grandes surfaces. En présence de produits comparables, de très rares cas de dyspnée chez des enfants asthmatiques ont été rapportés. Chez les patients ayant un système digestif sensible, des nausées peuvent survenir après un traitement de grande envergure. En cas d'hypersensibilité : éliminer le vernis avec une brosse à dents souple et du fil dentaire, puis rincer à l'eau chaude.

Mesures de précaution
Le jour du traitement, ne pr océder à aucune autre application de produits fluorés.
Après un traitement au vernis fluoré, cesser la prise de pastilles de fluor pendant quelques jours.
Ne pas avaler le vernis.

Dosage
Traitement de patients ayant une dentition lactéale : env. 0,25 ml de vernis fluoré.
Traitement de patients ayant une dentition mixte ou définitive : env. 0,40 ml de vernis fluoré.
Appliquer une fine pellicule de vernis fluoré sur le cément. Une pellicule épaisse se dissout aisément et n'apporte aucun avantage thérapeutique. L'expérience démontre que la quantité requise pour une dent complète se situe entre 0,25 ml et 0,40 ml.

Application
Nettoyer minutieusement la surface traitée afin d'éliminer le tartre.
Pour un meilleur résultat, éliminer complètement l'excès d'humidité / de salive de la dent à traiter.
Appliquer régulièrement le vernis fluoré, de manière à couvrir toute la surface d'une fine pellicule.
Humidifier la zone d'application (soit par un léger rinçage, soit avec le flux naturel de salive) afin de permettre la prise du vernis fluoré.
Les patients doivent être informés que toute alimentation solide ou absorption d'alcool, le nettoyage des dents et l'utilisation de fil dentaire doivent être évités durant les 4 heures suivant le traitement.

Stockage et durée de conservation
Stockage entre 4 et 23 °C. Ne pas utiliser après la date d'expiration indiquée.

DÜRR DENTAL FRANCE, 8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France
☎ +33 155691150
DÜRR DENTAL BELGIUM, Moldenheidebaan 97, 3191 Hever, Belgium
☎ +32 15616271

IT Istruzioni d'uso
Lunos® Lacca al fluoruro

con 22600 ppm di fluoruro / 1 ml contiene 50 mg di fluoruro di sodio (REF: CPZ030A0150)

Lacca contenente fluoruro per la desensibilizzazione dei denti per il trattamento della superficie dello smalto e della dentina. La lacca al fluoruro aderisce alle superfici umide e tollera residui di umidità e saliva. Si basa su una sospensione etanolica di colofonia con aroma artificiale e xilitolo.

Avviso
La lacca al fluoruro è un dispositivo medico. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'applicazione odontoiatrica professionale e può essere utilizzato solo da personale tecnico specializzato!

Indicazioni
La lacca al fluoruro serve per il trattamento e la protezione di denti ipersensibili e per la sigillatura dei tubuli dentinali nelle preparazioni di cavità o di superfici radicolari sensibili.

Avvertenze
La lacca al fluoruro contiene colofonia. In caso di nota ipersensibilità (allergie) a tale ingrediente della lacca al fluoruro, occorre rinunciare all'applicazione. La colofonia può compromettere la polimerizzazione e l'adesione dei compositi. Conformemente alla sua finalità d'impiego, la lacca al fluoruro ha una consistenza appiccicosa. Nell'utilizzare il tubo, residui di materiale sul filetto possono far sì che il tappo rimanga incollato. Rimuovere eventuali tracce di impurità con un panno contenente etanolo. La lacca al fluoruro non deve essere utilizzata su pazienti affetti da gengivite o stomatite ulcerosa. La lacca al fluoruro non è destinata al trattamento sistematico. In casi rari sono stati riferiti gonfiori edematosi, soprattutto dopo l'applicazione su superfici estese. In caso di preparati paragonabili, sono state riferite molto raramente difficoltà respiratorie in bambini affetti da asma. Nei pazienti con apparato digerente sensibile, dopo un trattamento estensivo, può insorgere nausea. In caso di ipersensibilità: rimuovere la lacca con uno spazzolino morbido e filo interdentale, quindi sciacquare con acqua calda.

Misure precauzionali
Nel giorno del trattamento, non eseguire altre applicazioni con preparati contenenti fluoruro.
Dopo il trattamento con la lacca al fluoruro, sospendere per qualche giorno l'assunzione di pastiglie al fluoruro.
Non ingerire la lacca.

Dosaggio
Trattamento di pazienti con denti da latte: circa 0,25 ml di lacca al fluoruro.
Trattamento di pazienti con denti transitori e permanenti: circa 0,40 ml di lacca al fluoruro.
Applicare un sottile strato di lacca al fluoruro sulla sostanza dura del dente. Uno strato spesso si stacca facilmente e non offre alcun vantaggio terapeutico. In base all'esperienza acquisita, il quantitativo necessario per una dentatura completa è compreso tra 0,25 ml e 0,40 ml.

Applicazione
Pulire a fondo dal tartaro la superficie da trattare.
Per un miglior risultato, rimuovere completamente umidità eccessiva/saliva dalla superficie da trattare.
Applicare la lacca al fluoruro in maniera uniforme, in modo tale da ricoprire l'intera superficie con uno strato sottile.
Inumidire il settore di applicazione (con un leggero risciacquo o con un flusso naturale di saliva), per garantire l'adesione della lacca.
Occorre indicare ai pazienti di evitare il consumo di alimenti e alcol, nonché la pulizia dentale e l'utilizzo del filo interdentale per 4 ore dopo il trattamento.

Immagazzinaggio e durata
Temperatura di immagazzinaggio: 4° C - 23° C. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l.
Via Dell'Artigianato n. 8, 20053 Muggiò (Mi), Italy ☎ +39 0395970300

ES Instrucciones de uso
Lunos® Laca de fluoruro

con 22600 ppm de fluoruro / 1 ml contiene 50 mg de fluoruro de sodio (REF: CPZ030A0150)

Laca con fluoruro para la desensibilización del diente para el tratamiento de superficies de esmalte dental y de dentina. La laca de fluoruro se adhiere en superficies húmedas y tolera restos de humedad y de saliva. Se basa en una suspensión etanólica de colofonio con aroma artificial y xylitol.

Atención
La laca de fluoruro es un producto medicinal. Este producto ha sido desarrollado únicamente para la aplicación odontológica profesional y sólo debe ser utilizada por personal técnico especializado.

Indicaciones
La laca de fluoruro sirve para el tratamiento y la protección de dientes hipersensibles y para sellar los tubos de dentina en preparaciones de cavidades o de superficies sensibles de la raíz.

Indicaciones de advertencia
La laca de fluoruro contiene colofonio. En caso de tener una sobresensibilidad conocida (alergias) contra este ingrediente de laca de fluoruro, es necesario renunciar a esta aplicación. Colofonio puede adectar la polimerización y la adhesión de compósitos. Conforme a su objetivo de aplicación, la laca de fluoruro tiene una consistencia pegajosa. En caso de utilizar el tubo, restos de material en la rosca pueden causar que se pegue la tapa. En caso dado, limpiar suciedades con un paño con etanol. La laca de fluoruro no debe aplicarse en pacientes con infecciones de mucosas bucales o encías ulcerantes. La laca de fluoruro no ha sido desarrollada para el tratamiento sistemático. Rara vez se informó de hinchazones edematosas, especialmente después de aplicar en superficies grandes. En caso de preparados comparables se informó muy raramente acerca de dificultades de respiración en caso de niños con asma. En caso de pacientes con un sistema digestivo sensible pueden producirse náuseas después de un tratamiento amplio. En caso de sobresensibilidad: retirar la laca con un cepillo suave y con hilo dental y enjuagar a continuación con agua tibia.

Medidas de precaución
El día del tratamiento, no realizar otras aplicaciones con preparados fluorados.
Evitar el consumo de tabletas de fluoruro durante algunos días después del tratamiento con la laca de fluoruro.
No ingerir la laca.

Dosificación
Tratamiento de pacientes con dientes de leche aprox. 0,25 ml con laca de fluoruro.
Tratamiento de pacientes con dentadura mixta o con dentadura permanente aprox. 0,40 ml laca de fluoruro.
Aplicar una delgada capa de laca de fluoruro en la sustancia dura del diente. Una película gruesa se suelta fácilmente y no ofrece ventajas terapéuticas. Por experiencia, la necesidad requerida para una dentadura completa está entre 0,25 ml y 0,40 ml.

Aplicación
Limpiar la superficie de tratamiento de sarro.
Para un resultado mejor, eliminar humedad excesiva / saliva por completo de la superficie a tratar.
Aplicar la laca de fluoruro de manera uniforme, de manera que la superficie completa está cubierta con una fina capa.
Humedecer el sector de aplicación (sea con ligero enjuague o por caudal natural de saliva) para garantizar el secado de la laca de fluoruro.
Es necesario indicar a los pacientes evitar el consumo de alimentos, alcohol así como la limpieza dental y el uso de hilo dental durante 4 horas después del tratamiento.

Almacenamiento y durabilidad
Almacenamiento a 4°C - 23°C. No usar la laca después de la fecha de caducación.

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A., Serra de la Salut, 11 N-6, Poligono Industrial Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain
☎ +34 937183335

PT Instruções de utilização
Lunos® Verniz de fluoreto

com 22600 ppm fluoreto / 1 ml contém 50 mg fluoreto de sódio (REF: CPZ030A0150)

Verniz composto por fluoreto para dessensibilização do dente para tratamento da superfície do esmalte e da dentina. O verniz de fluoreto adere a superfícies húmidas e tolera resíduos de humidade e de saliva. A sua composição é baseada numa suspensão etanólica em colofónia com aroma artificial e xilitol.

Atenção
O verniz de fluoreto é um produto médico. Este produto destinase somente à aplicação odontológica profissional e deve ser usado exclusivamente por pessoal especializado!

Indicações
O verniz de fluoreto é indicado para o tratamento e proteção em casos de hipersensibilidade dos dentes e para a selagem de túbulos dentinários em preparações cavitárias ou superfícies da raiz sensíveis.

Indicações de advertência
O verniz de fluoreto contém colofónia. Em caso de hipersensibilidade (alergias) conhecida a estes compostos do verniz de fluoreto a sua aplicação deve ser evitada. A colofónia pode afetar a polimerização e a aderência de materiais compósitos. De acordo com a sua finalidade de aplicação, o verniz de fluoreto tem uma consistência viscosa. Ao utilizar o tubo os restos de material na rosca podem causar a fixação da tampa. As eventuais sujidades devem ser removidas com um pano embebido em etanol. O verniz de fluoreto não deve ser usado em pacientes com inflamação da gengiva ou da mucosa bucal. O verniz de fluoreto não se destina a tratamentos sistémicos. Raramente inchaços edematosos especialmente após aplicação em superfícies maiores. Com preparações comparáveis existem muito raramente relatos de depressão respiratória em crianças com asma. Em pacientes com sistema digestivo sensível podem ocorrer náuseas após tratamento prolongado. Em caso de hipersensibilidade: remover o verniz com uma escova dos dentes macia e fio dental. Em seguida, lavar com água morna.

Medidas de precaução
No dia do tratamento podem ser realizadas outras aplicações com preparados compostos por fluoreto.
Após o tratamento com o verniz de fluoreto, suspender por alguns dias a toma de comprimidos de fluoreto.
Não ingerir o verniz.

Dosagem
Tratamento de pacientes com primeira dentição aprox. 0,25 ml de verniz de fluoreto.
Tratamento de pacientes com dentição provisória ou dentição permanente aprox. 0,40 ml de verniz de fluoreto.
Colocar uma camada fina de verniz de fluoreto no tecido dental duro. Uma camada mais espessa solta-se facilmente e não oferece vantagens terapêuticas. As experiências demonstraram que para uma dentição completa é requerido entre 0,25 ml e 0,40 ml.

Utilização
Limpar profundamente a superfície a tratar de tártaro dentário.
Para um melhor resultado remover totalmente restos de humidade/saliva da superfície a tratar.
Colocar uniformemente o verniz de fluoreto de modo a cobrir toda a superfície com uma camada fina.
Humedecer a área de aplicação (ou por lavagem suave ou pela produção natural de saliva) para garantir a aderência do verniz de fluoreto.
Os pacientes devem ser aconselhados a evitar alimentos sólidos, álcool, limpar os dentes e usar fio dental nas 4 horas seguintes ao tratamento.

Armazenamento e durabilidade
Armazenamento a 4°C - 23°C. Não usar depois de atingida a data de validade.

Distribuído em Portugal por: DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A.
Serra de la Salut, 11 N-6, Poligono Industrial Santiga,
08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

NL Gebruikshandleiding
Lunos® fluoridelak

met 22600 ppm fluoride / 1 ml bevat 50 mg natriumfluoride (REF: CPZ030A0150)

Lak op basis van fluoride om de gevoeligheid van tanden te verminderen voor de behandeling van tandglazuur- en dentineoppervlakken. De fluoridelak hecht aan vochtige oppervlakken en tolereert vocht- en speekselresten. De lak is vervaardigd op basis van een ethanolsuspensie bestaande uit colofonium met een kunstmatig aroma en xylitol.

Let op
Deze fluoridelak is een medisch hulpmiddel. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik in tandartspraktijken en mag alleen door geschoold personeel worden toegepast!

Indicaties
Fluoridelak is gemaakt voor het behandelen en beschermen van overgevoelige tanden en voor het afdekken van dentinetubuli (dentinekanaaltjes) bij cavitatiepreparaties of gevoelige worteloppervlakken.

Waarschuwingen
Fluoridelak bevat colofonium. Is bekend dat er enige vorm van overgevoeligheid (allergieën) bestaat voor dit bestanddeel van fluoridelak, dan dient men het gebruik hiervan te staken. Colofonium kan schadelijk zijn voor de polymerisatie en de verbinding van composieten. Zoals vereist voor het gebruik heeft de fluoridelak een plakkerige textuur. Bij gebruik van de tube kunnen resten van het product die op de schroefdop achterblijven, ervoor zorgen dat deze vastplakt. Veeg eventuele onzuiverheden af met behulp van een doek die ethanol bevat. Gebruik de fluoridelak niet bij patiënten met ulcererende tandvlees- of mondslijmvliesontstekingen. De fluoridelak is niet bedoeld voor systemische behandeling. Sporadisch is melding gemaakt van oedemateuze zwellingen, met name na gebruik van het product op grotere oppervlakken. Bij vergelijkbare geneesmiddelen is zeer sporadisch melding gemaakt van ademnood bij kinderen met astma. Patiënten met een gevoelig maagdarmkanaal kunnen na uitgebreide behandeling met het product last hebben van misselijkheid. Bij overgevoeligheid: verwijder de lak met behulp van een zachte tandenborstel en floszijde, en spoel vervolgens met warm water.

Voorzorgsmaatregelen
Gebruik op de behandelingsdag geen andere fluoridebevattende producten.
Neem gedurende enkele dagen na de behandeling met de fluoridelak geen fluoridetabletten in.
Slik de lak niet in.

Dosering
Behandeling van patiënten met een melkgebit: ca. 0,25 ml fluoridelak.
Behandeling van patiënten met een wisselgebit of blijvend gebit: ca. 0,40 ml fluoridelak.
Breng een dunne laag fluoridelak aan op het tandweefsel. Een dikke laag laat gemakkelijk los en heeft geen therapeutische werking. De ervaring leert dat de voor een compleet gebit benodigde hoeveelheid tussen 0,25 ml en 0,40 ml bedraagt.

Toepassing
Verwijder tandsteen grondig van het te behandelen oppervlak.
Verwijder voor een beter resultaat alle overtollige vocht/speeksel van het te behandelen oppervlak.
Breng de fluoridelak gelijkmatig aan, zodat het gehele oppervlak is bedekt met een dunne laag.
Bevochtig het te behandelen gebied (door even te spoelen of met natuurlijk speeksel) om er zeker van te zijn dat de fluoridelak hard kan worden.
Wij adviseren u als patiënt tijdens de 4 uren na de behandeling, geen vast voedsel of alcohol te nuttigen en uw tanden niet te poetsen of te flossen.

Opslag en houdbaarheid
Bewaren bij een temperatuur tussen 4°C en 23°C. Niet gebruiken na het verstrijken van de houdbaarheidstermijn.

SV Bruksanvisning
Lunos® Fluoridlack

med 22600 ppm fluorid / 1 ml innehåller 50 mg natriumfluorid (REF: CPZ030A0150)

Fluoridhaltig lack för desensibilisering av tänder vid behandling av emalj- och dentinytor. Fluoridlacken vidhäftar vid fuktiga ytor och tolererar rester av fukt och saliv. Den är baserad på en etanolsuspension av kolofonium med syntetisk arom och xylitol.

Observera
Fluoridlacken är en medicinsk produkt. Den här produkten är endast avsedd för professionellt tandmedicinskt bruk och får endast användas av fackpersonal!

Indikationer
Fluoridlacken används för behandling och skydd av överkänsliga tänder och för försegling av dentinkanaler vid kavitetspreparationer eller andra känsliga rotytor.

Varningsinformation
Fluoridlacken innehåller kolofonium. Vid känd överkänslighet (allergier) mot detta ämne ska fluoridlacken inte användas. Kolofonium kan påverka polymeriseringen och vidhäftningen av kompositmaterial. Beroende på användningsändamål har fluoridlacken en klibbig konsistens. När tuben används kan materialrester på skruvgängan leda till att locket limmas fast. Torka av eventuella föroreningar med en etanolhaltig duk. Fluoridlacken ska inte användas på patienter med blödande inflammationer i tandkött eller munslemhinnor. Fluoridlacken är inte avsedd för systemisk behandling. Rapporter om ödematösa svullnader, i synnerhet efter användning på större ytor, är sällsynta. Med jämförbara preparat är rapporter om andnöd för barn med astma mycket sällsynta. Patienter med känslig matsmältning kan känna sig illamående efter omfattande behandling. Vid överkänslighet: avlägsna lacken med mjuk tandborste och tandtråd, och spola med varmt vatten.

Försiktighetsåtgärder
Använd inte andra fluoridhaltiga preparat under behandlingsdagen.
Ta inte fluoridtabletter några dagar efter behandling med fluoridlack.
Svälj inte lacken.

Dosering
Behandling av patienter med mjölktänder ca 0,25 ml fluoridlack.
Behandling av patienter med mjölktänder och permanenta tänder eller endast permanenta tänder ca 0,40 ml fluoridlack.
För på ett tunt lager fluoridlack på emaljen. Ett tjockare lager löses upp lättare och ger inga behandlingsmässiga fördelar. Av erfarenhet vet vi att en komplett tandupps ättning förbrukar 0,25 ml till 0,40 ml.

Användning
Rengör behandlingsytan noggrant från tandsten.
Avlägsna all överflödig fukt/saliv från ytan som ska behandlas för att få ett bättre resultat.
För på ett jämnt lager fluoridlack så att hela ytan täcks av ett tunt skikt.
Användningsytan ska fuktas (antingen genom att skölja lätt eller genom naturligt salivflöde) för att fluoridlacken garanterat ska vidhäfta.
Informera patienterna om att inte ista fast föda, alkohol, rengöra tänderna eller använda tandtråd inom fyra timmar efter behandlingen.

Förvaring och hållbarhet
Förvaring vid 4 till 23 °C. Använd inte produkten om utgångsdatumet passerats.

FI Käyttöohje
Lunos® fluoridilakka

22600 ppm fluoridia / 1 ml sisältää 50 mg natriumfluoridia (REF: CPZ030A0150)

Fluoridipitoinen lakka hampaan yliherkkyyden poistamiseen kiilteen ja hammaspintojen käsittelyn yhteydessä. Fluoridilakka tarttuu kosteisiin pintoihin ja toleroi jäljelle jäänyttä kosteutta ja sylkeä. Pohjana on etanolinen perus suspensio kolofonia ja keinotekoisesta aromista sekä ksylitolista.

Huomio
Fluoridilakka on lääkinnällinen tuote. Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattimaiseen hampaiden hoitoon ja sitä saa käyttää vain koulutettu henkilökunta!

Indikaatiot
Fluoridilakkaa käytetään erityisherkkien hampaiden käsittelyyn ja suojeluun sekä dentiinitubulusten sulkemiseen kaviteettipreparaatioiden tai herkkien juuripintojen yhteydessä.

Varoitukset
Fluoridilakka sisältää kolofonia. Jos potilas on yliherkkä (allerginen) fluoridilakan sisältämille aineille, ainetta ei saa käyttää. Kolofoni voi vaikuttaa polymerisaatioon ja komposiitin kiinnittymiseen. Käyttötarkoitustaan vastaten fluoridilakan koostumus on liimamainen. Käytettäessä tuubia materiaalin jäännökset ruuvikierteen päällä voivat aiheuttaa kannen liimautumisen kiinni. Poista loput jäännökset tarvittaessa etanolipitoisella liinalla. Fluoridilakkaa ei saa käyttää potilaiden kohdalla, jotka kärsivät haavautuvista ikenistä tai suun limakalvojen tulehduksista. Fluoridilakkaa ei ole tarkoitettu järjestelmällisen käyttöön. Harvan kerran on ilmoitettu turvotuksesta, erityisesti käytettäessä tuotetta suuremmilla pinnoilla. Vastaavien preparaattien kohdalla on erittäin harvoin tullut tietoon, että lapset, joilla on todettu astma, saisivat hengenahdistusta. Jos potilaan ruuansulatusjärjestelmä on herkkä, potilaalla saattaa esiintyä pahoinvointia tuotteen runsaan käytön jälkeen. Jos kyseessä on yliherkkyys, poista lakka pehmeällä hammasharjalla ja hammaslangalla, huuhtele sen jälkeen lämpimällä vedellä.

Varotoimenpiteet
Älä käytä hoitopäivänä muita fluoridipitoisia preparaatteja.
Keskeytä fluoriditablettien ottaminen muutamaksi päiväksi fluoridilakka käsittelyn jälkeen.
Älä niele lakkaa.

Annostelu
Potilaat, joilla on maitohampaat: n. 0,25 ml fluoridilakkaa.
Potilaat, joilla hampaat vaihtuvat maitohampaista pysyviin hampaisiin tai joilla on pysyvät hampaat: n. 0,40 ml fluoridilakkaa.
Levitä ohut kerros fluoridilakkaa kovaan hammasaineeseen. Paksu kalvo irtaantuu helposti eikä siitä ole hyötyä hoidon kannalta. Kokemuksen mukaan tarvittava määrä koko purukalustoa varten on välillä 0,25 ml ja 0,40 ml.

Käyttö
Puhdista käsiteltävä pinta huolellisesti hammaskivestä.
Jotta lopputulos olisi parempi, poista liika kosteus/sylki käsiteltävältä pinnalta.
Levitä fluoridilakka tasaisesti siten, että koko pinta on ohuen kalvon peitossa.
Kostuta käyttöalue (huuhtelemalla kevyesti tai luonnollisella tavalla syljellä), jotta voit taata fluoridilakan oikeanlaisen käyttäytymisen.
Potilasta pitää muistuttaa siitä, että 4 tuntia käsittelyn jälkeen kiinteän ruuan syöminen, alkoholi, hampaiden pesu sekä hammaslangan käyttö on kiellettyä.

Varastointi ja säilyvyys
Varastointi 4°C - 23°C. Kun viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut, tuotetta ei saa enää käyttää.

NO Bruksanvisning
Lunos® fluoridlakk

med 22600 ppm fluorid / 1 ml inneholder 50 mg natriumfluorid (REF: CPZ030A0150)

Fluoridholdig lakk til tann de-sensibilisering for behandling av emalje- og detinoverflater. Fluoridlakken setter seg fast på fuktige overflater og tolererer restfuktighet og spytt. Den er basert på en etanolsuspensjon av kolofonium med kunstig smakstilsetning og xylitol.

Aktelse
Fluoridlakk er et medisinsk produkt. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell dental bruk og må kun anvendes av fagpersonell!

Indikasjoner
Fluoridlakken brukes til behandling og beskyttelse av overfølsomme tenner og til forsegling av dentinal tubuli ved hulrom forberedelser eller ømfintlige rotoverflater.

Advarsler
Fluoridlakken inneholder kolofonium. Ved kjent overfølsomhet (allergier) mot dette innholdsstoffet til fluoridlakk skal en avse fra bruken. Kolofonium kan påvirke polymeriseringen og vedheft av kompositter. Tilsvarende bruksformålet har fluoridlakk en klebrig konsistens. Ved bruk av tuben kan materialrester på skruegjengen før til at lokket klistrer fast. Tørk bort evt. forurensninger med en etanolholdig klut. Fluoridlakk skal ikke brukes ved pasienter med ulcererende tannkjøtt eller oral slimhinnebetennelse. Fluoridlakk er ikke ment for systemisk behandling. I sjeldne tilfeller ble det rapportert ødematøse hevelse, spesielt etter påføring på større flater. Ved sammenlignbare preparater ble det rapportert svært sjeldne tilfeller av ødenød hos barn med astma. Ved pasienter med sensitivt fordøyelsessystem kan det oppstå kvalme etter omfattende behandling. Ved overfølsomhet: Fjern lakk med en myk tannbørste og tanntråd, skyll så med varmt vann.

Forholdsregler
På dagen for behandling skal det ikke foretas ytterligere anvendelser med fluoridholdige preparater.
Stopp inntaket av fluoridtabletter i noen dager etter behandling med fluoridlakk.
Ikke svelg lakken.

Dosering
Behandling av pasienter med melketenner ca. 0,25 ml fluoridlakk.
Behandling av pasienter med vekseltenner eller permanente tenner ca. 0,40 ml fluoridlakk.
Påfør en tynn film med fluoridlakk på den harde tannstrukturen. En tykk film løsner lett og gir ingen behandlingsmessige fordeler. Erfaring har vist at det for et fullstendig sett med tenner er nødvendige med mellom 0,25 ml og 0,40 ml.

Bruk
Rengjør behandlingsområdet grundig for tannstein.
For best resultat, fjern all overflødig fuktighet/spytt fra området som skal behandles.
Påfør fluoridlakken jevnt, slik at hele overflaten er dekket med en tynn film.
Fukt bruksområdet (enten med en lett skylling eller gjennom naturlig spyttflyt), for å sikre at fluoridlakken fester seg.
Pasientene må rådes til å unngå fast mat, alkohol, rengjøring av tennene og bruk av tanntråd, i 4 timer etter behandling.

Lagring og holdbarhet
Lagring ved 4°C - 23°C. Må ikke brukes etter utløp av utløpsdatoen.

DA Brugsvejledning
Lunos® Fluoridlak

med 22600 ppm fluorid / 1 ml indeholder 50 mg natriumfluorid (REF: CPZ030A0150)

Fluoridholdig lak til tand de-sensibilisering for behandling af emalje- og dentinoverflader. Fluoridlakken sætter sig fast på fuktige overflader og tåler rester af fugt og spyt. Den er baseret på en ethanolsuspension af kolofonium med kunstig aroma og xylitol.

Obs
Fluoridlakken er et medicinsk produkt. Dette produkt er kun beregnet til professionel tandlægebrug og må udelukkende anvendes af fagpersonale!

Indikationer
Fluoridlakken anvendes til behandling og beskyttelse af hypersensible tænder og til forsegling af dentintubuli ved kavitetspræparationer eller følsomme rodoverflader.

Advarsler
Fluoridlakken indeholder kolofonium. Ved konstateret overfølsomhed (allergier) mod dette indholdsstof i fluoridlak må produktet ikke anvendes. Kolofonium kan forringe polymerisation og vedhæftning ved kompositter. Fluoridlak har i henhold til sit anvendelsesformål en klæbrig konsistens. Når tuben anvendes, kan materialerester på skruegevindet medføre, at dækslet klæber fast. Tør eventuelle urenheder af med en serviet med ethanol. Fluoridlakken må ikke anvendes ved patienter med ulcererende tandkads- eller mundslimhindebetændelse. Fluoridlakken er ikke beregnet til systemisk behandling. Der er kun i sjældne tilfælde indberettet ødematøse hævelser, særligt efter anvendelse over større flader. Ved sammenlignelige præparater er der kun meget sjældent indberettet åndenød hos børn med astma. Patienter med følsomt fordøjelsessystem kan opleve kvalme efter omfattende behandling. Ved overfølsomhed: Fjern lakken med en blød tandbørste og tandtråd, og skyl dernæst efter med varmt vand.

Lakier fluorkowy służy do zabiegów i ochrony nadwrażliwych zębów oraz zabezpieczania szczelin w szkliwie podczas preparacji otworów lub wrażliwych powierzchni korzenia.

Wskazówki ostrzegawcze
Lakier fluorkowy zawiera kalafonię. W przypadku stwierdzonej nadwrażliwości (alergii) na ten składnik lakieru fluorkowego należy zrezygnować z jego stosowania. Kalafonia może wpływać na polimeryzację i przyleganie kompozytów. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem lakier fluorkowy ma lepką konsystencję. Podczas korzystania z tuby resztki materiału na gwincie nakrętki mogą prowadzić do przyklejenia się pokrywy. Ewentualne zanieczyszczenia wyczyścić chusteczką nasączoną etanolem. Lakieru fluorkowego nie należy stosować u pacjentów z owrzodzeniem dziąseł lub zapaleniem śluzówki jamy ustnej. Lakier fluorkowy nie jest przeznaczony do systematycznego stosowania. Zgłoszono rzadkie przypadki obrzęków, szczególnie po zastosowaniu na większej powierzchni. W przypadku porównywalnych preparatów bardzo rzadko zgłaszano bezdech u dzieci z astmą. U pacjentów z wrażliwym systemem trawiennym po zabiegu o szerokim zakresie mogą występować mdłości. W przypadku nadwrażliwości usunąć lakier miękką szczoteczką do zębów i nitką do zębów, na koniec przepłukać ciepłą wodą.

Środki ostrożności
W dniu zabiegu nie poddawać się żadnym innym zabiegom z preparatami zawierającymi fluor.
Po zabiegu z lakierem fluorkowym na kilka dni odstawić przyjmowanie tabletek z fluorem.
Nie połykać lakieru.

Dozowanie
Zabieg u pacjenta z uzębieniem mlecznym ok. 0,25 ml lakieru fluorkowego.
Zabieg u pacjenta z uzębieniem mieszanym i stałym ok. 0,40 ml lakieru fluorkowego.
Nanieść cienką warstwę lakieru fluorkowego na włosie szczoteczki do zębów. Grubsza warstwa łatwo odpada i nie zapewnia żadnych zalet terapeutycznych. Zgodnie z doświadczeniem wymagane zapotrzebowanie na cały zgryz wynosi pomiędzy 0,25 a 0,40 ml.

Zastosowanie
Dokładnie wyczyścić powierzchnię zabiegową z kamienia nazębnego.
Aby uzyskać lepsze rezultaty, całkowicie usunąć nadmiar wilgoci/śliny z powierzchni do zabiegu.
Lakier fluorkowy należy nałożyć równomiernie, tak aby cała powierzchnia była pokryta cienką warstwą.
Zwilżyć obszar zastosowania (przez delikatne przepłukanie lub naturalnym napływem śliny), aby zapewnić naturalne wymagane zapotrzebowanie na cały zgryz wynosi pomiędzy 0,25 a 0,40 ml.
Należy poinformować pacjenta, że 4 godziny po zabiegu należy unikać stałych pokarmów, alkoholu, mycia zębów jak też stosowania nitki do zębów.

Magazynowanie i termin przydatności
Magazynowanie w temperaturze 4°C - 23°C. Nie stosować po przekroczeniu terminu przydatności do użycia.

CS Návod k použití
Lunos® Fluoridvý lak

s 22600 ppm fluoridu / 1 ml obsahuje 50 mg fluoridu sodného (REF: CPZ030A0150)

Lak s obsahem fluoridu k desenzibilizaci zubů pro ošetření povrchů skloviny a dentinu. Fluoridový lak přilne na vlhký povrch a toleruje zbytky tekutiny a slin. Jeho základem je etanolická suspenze z kolofonia s umělým aroma a xylitolem.

Pozor
Fluoridový lak je zdravotnický prostředek. Tento výrobek je určený pouze pro profesionální dentální použití a smí ho používat výlučně kvalifikovaný personál!

Indikace
Fluoridový lak slouží k ošetření a ochraně hypersenzibilních zubů a k uzavření dentinových tubulů při preparacích kavit nebo při citlivém povrchu kořene.

Výstražné pokyny
Fluoridový lak obsahuje kolofonium. Při známé přecitlivenosti (alergii) proti této látce obsažené ve fluoridovém laku aplikaci neprovádějte. Kolofonium může negativně ovlivnit polymerizaci a přilnavost kompozitů. V souladu se svým účelem použití má fluoridový lak lepivou konzistenci. Při použití tuby mohou zbytky materiálu na šroubovacím závitu vést k přilepení víčka. Případné nečistoty setřete hadříkem navlhčeným etanolem. Fluoridový lak nepoužívejte u pacientů s ulcerujícími záněty dásní nebo sliznice v ústech. Fluoridový lak není určený pro systémové ošetření. Vzácně byly hlášeny edematózní otoky, zejména po aplikaci na větších plochách. U srovnatelných přípravků byla velmi vzácně hlášena dušnost u dětí s astmatem. U pacientů s citlivým trávicím systémem se může po rozsáhlém ošetření vyskytnout nevolnost. Při přecitlivělosti: lak odstraňte měkkým zubním kartáčkem a dentální nití, poté opláchněte teplou vodou.

Preventivní opatření
V den ošetření neprovádějte žádné další aplikace s přípravky obsahujícími fluorid.
Po ošetření fluoridovým lakem několik dní vysaďte užívání fluoridových tablet.
Lak nepolykejte.

Dávkování
Ošetření pacientů s mléčným chrupem cca 0,25 ml fluoridového laku.
Ošetření pacientů se smíšeným chrupem nebo trvalým chrupem cca 0,40 ml fluoridového laku.
Naneste tenký film fluoridového laku na tvrdou zubní substanci. Silný film se snadno oddělí a neposkytuje terapeutické výhody. Podle zkušeností činí potřebné množství pro kompletní chrup od 0,25 ml do 0,40 ml.

Aplikace
Z ošetřované plochy důkladně odstraňte zubní kámen.
Pro lepší výsledek odstraňte nadměrnou vlhkost/sliny kompletně z ošetřované plochy.
Fluoridový lak rovnoměrně naneste tak, aby byl kompletní povrch pokrytý tenkým filmem.Oblast aplikace navlhčete (buď lehkým opláchnutím nebo přirozeným tokem slin), aby se zaručilo tuhnutí fluoridového laku.
Pacienti musí být upozorněni na to, že 4 hodiny po ošetření nesmí přijímat pevnou stravu, požívat alkohol, čistit si zuby a používat dentální nit.

Skladování a trvanlivost
Skladování při 4 °C - 23 °C. Po uplynutí doby použitelnosti již nepoužívat.

SK Návod na použitie
Lunos® Fluoridový lak

s 22600 ppm fluoridu / 1 ml obsahuje 50 mg fluoridu sodného (REF: CPZ030A0150)

Lak s obsahom fluoridu na desenzibilizáciu zubov pri ošetrovaní povrchov zubnej skloviny a zuboviny. Fluoridový lak sa prichytí na vlhkých povrchoch a toleruje zvyšky vlhkosti a slín. Lak sa zakladá na etanolovej suspenzii z kolofónia s umelou arómou a xylitolom.

Pozor
Fluoridový lak je medicínskym výrobkom. Tento výrobok je určený len na profesionálne použitie zubným lekárom a smie ho používať výlučne odborný personál!

Indikácie
Fluoridový lak slúži na ošetrovanie a na ochranu hypersenzibilných zubov a na pečatenie dentínových tubulov pri preparáciách kavity alebo pri citlivých povrchoch koreňov.

Informácia o nebezpečenstve
Fluoridový lak obsahuje kolofónium. Pri známom precitlivení (alergie) na obsahovú látku fluoridového laku je potrebné zriecť sa použitia. Kolofónium môže negatívne ovplyvniť polymerizáciu a prilnavosť kompozitov. Na základe svojho účelu aplikácie má fluoridový lak lepivú konzistenciu. Pri použití tuby môžu zvyšky materiálu na závite viesť k zlepeniu vrchnáka. Prípadné znečistenia poutierajte utierkou s obsahom etanolu. Fluoridový lak sa nesmie používať u pacientov s vredovitými zápalmi dásien a sliznice ústnej dutiny. Fluoridový lak nie je určený na systémové ošetrenie. Ojedinele sa vyskytli správy o edematóznych opuchoch, predovšetkým po aplikovaní na veľkých plochách. Pri porovnateľných preparátoch sa veľmi zriedka vyskytovali správy o dýchavičnosti u detí s astmou. U pacientov s citlivou tráviacou sústavou sa môže pri rozsiahlom ošetrení vyskytnúť nevoľnosť. Pri nadmernej citlivosti: lak odstráňte pomocou mäkkej zubnej kefky a dentálnej nite, následne vypláchnite teplou vodou.

Bezpečnostné opatrenia
V deň ošetrenia nevykonávajte ďalšie aplikovania preparátov s obsahom fluoridov.
Užívanie fluoridových tabliet vysaďte po ošetrení fluoridovým lakom na niekoľko dní.
Lak neprehĺtajte.

Dávkovanie
Ošetrenie pacienta s mliečnym chrupom cca 0,25 ml fluoridového laku.
Ošetrenie pacienta so zmiešaným alebo trvalým chrupom cca 0,40 ml fluoridového laku.
Tenký film fluoridového laku naneste na tvrdú substanciu zuba. Hrubý film sa ľahko uvoľní a neposkytuje žiadne terapeutické výhody. Podľa skúseností leží vyžadovaná spotreba pre kompletný chrup medzi 0,25 ml a 0,40 ml.

Použitie
Ošetrovanú plochu dôkladne očistite od zubného kameňa.
Pre lepší výsledok kompletne odstráňte nadmernú vlhkosť/sliny z ošetrovanej plochy.
Fluoridový lak naneste rovnomerne tak, aby bol kompletný povrch pokrytý tenkým filmom.
Navlhčite oblasť aplikácie (buď ľahkým vypláchnutím alebo prirodzeným tokom slín), aby sa zaručilo previazanie fluoridového laku.
Pacienti sa musia upozorniť na to, aby 4 hodiny po ošetrení nejedli tuhú stravu, nepili alkohol, aby sa vyhli čisteniu zubov a tiež používaniu dentálnej nite.

Skladovanie a trvanlivosť
Skladovanie pri 4°C - 23°C. Nepoužívať po uplynutí dátumu exspirácie.

SL Navodila za uporabo
Lunos® Fluoridni lak

z 22600 ppm fluorida / 1 ml vsebuje 50 mg natrijevega fluorida (REF: CPZ030A0150)

Lak s fluorom za desenzibilizacijo zob za posege na sklenini in dentinu. Fluoridni lak se oprime vlažnih površin in tolerira ostanke vlage in sline. Temelji na raztopini etanola iz kolofonije z umetno aromo in ksilitolom.

Pozor
Fluoridni lak je medicinski izdelek. Ta proizvod je namenjen izključno profesionalni uporabi v zobozdravstvu, zato ga sme uporabljati le strokovno osebje!

Indikacije
Fluoridni lak služi kot sredstvo za tretiranje in zaščito močno občutljivih zob ter za zaprtje dentinskih kanalčkov pri preparaciji kavitet oziroma pri preobčutljivih koreninskih površinah.

Opozorila
Fluoridni lak vsebuje kolofonijo. Pri znanih preobčutljivostih (alergijah) na to snov v fluoridnem laku izdelka ne uporabljajte. Kolofonija lahko negativno vpliva na polimerizacijo in oprijem kompozitov. Zaradi njegovega namena ima fluoridni lak lepljivo konsistenco. Pri uporabi tube lahko ostanki materiala na navoju privedejo do sprijetja pokrovčka. Nečistoče po potrebi obrišite s krpo, natopljeno v etanolu. Fluoridni lak se ne sme uporabljati pri pacientih z razjedami dlesni ali vnetjem ustne sluznice. Fluoridni lak ni namenjen sistemskemu zdravljenju. Pojavi edemov, še posebej po nanosu na večje površine, so redki. Pri primerljivih preparatih so se zelo redko pojavile težave pri dihanju pri otrocih z astmo. Pri pacientih z občutljivim prebavnim sistemom se lahko pri obsežni uporabi pojavi slabost. Pri preobčutljivosti: lak odstranite z mehko zobno ščetko in nitko, nato sperite s toplo vodo.

Previdnosti ukrepi
Na dan posega pri pacientu ne uporabljajte več preparator z vsebnostjo fluora.
Po posegu s fluoridnim lakom za nekaj dni prekinite z jemanjem tablet s fluorom.
Laka ne požirajte.

Doziranje
Tretiranje pacientov z mlečnimi zobmi - pribl. 0,25 ml fluoridnega laka.
Tretiranje pacientov z odstranljivo protezo in stalnimi zobmi - pribl. 0,40 ml fluoridnega laka.
Na zob nanesite tanek sloj fluoridnega laka. Debelejši sloj zlahka odstopi in ne ponuja nobenih terapevtskih prednosti. Po izkušnjah je za kompletni ugriz potrebnega med 0,25 ml in 0,40 ml.

Uporaba
S površine, ki jo boste obdelali, temeljito očistite zobni kamen.
Za boljši rezultat s površine popolnoma odstranite odvečno vlago/slino.
Fluoridni lak nanesite enakomerno, tako da bo celotna površina prekrita s tankim slojem laka.
Mesto obdelave navlažite (ali z omočenjem z vodo ali naravno s slino), da zagotovite oprijem fluoridnega laka.
Pacienta je treba opozoriti na to, da vsaj 4 ure po posegu ne sme uživati trde hrane in piti alkohola ter uporabljati zobne ščetke in nitke.

Skladiščenje in rok trajanja
Skladišči pri 4°C - 23°C. Po poteku datuma uporabnosti izdelka ne uporabljajte več.

Distributor: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834

HR Upute za upotrebu
Lunos® fluoridni lak

uz 22600 ppm fluorida / 1 ml sadrži 50 mg natrijevog fluorida (REF: CPZ030A0150)

Fluoridni lak za desenzibilizaciju zubi za liječenje caklinskih i dentinskih površina. Fluoridni lak prianja na vlažne površine i tolerira ostatke vlage i sline. Temelji se na etanolskoj suspenziji od kolofonija s umjetnom aromom i ksilitolom.

Pažnja
Fluoridni lak medicinski je proizvod. Ovaj je proizvod namijenjen samo stomatološkoj primjeni i smije ga upotrebljavati isključivo stručno osoblje!

Indikacije
Fluoridni lak koristi se za tretiranje i zaštitu preosjetljivih zubi te za brtvljenje dentinskih tubila kod preparacije kaviteta ili osjetljivih površina korijena.

Napomene o opasnostima
Fluoridni lak sadrži kolofoniji. U slučaju poznatih preosjetljivosti (alergije) na ovaj sastojak fluoridnog laka, primjena se isključuje. Kolofonij može utjecati na polimerizaciju i prianjanje kompozita. Sukladno njegovoj primjeni, fluoridni lak ima ljepljivu konzistentnost. Prilikom korištenja cijevi, ostaci materijala na navojnom vijku mogu uzrokovati ljepljenje poklopca. Onečišćenja pobrišite tkaninom natopljenom etanolom. Fluoridni lak ne smije se koristiti kod pacijenata s ulceriranim oralnim mukozitisom ili gingivitisom. Fluoridni lak nije namijenjen za sustavno liječenje. Rijetki su slučajevi edematoznog otjecanja, posebno nakon primjene na većim površinama. Za slične pripravke vrlo su rijetki slučajevi respiratornog distresa kod djece s astmom. Kod pacijenata s osjetljivim probavnim sustavom se nakon obilnog liječenja može pojaviti mučnina. U slučaju preosjetljivosti: lak uklonite mekom četkicom i zubnim koncem, potom isperite toplom vodom.

Mjere opreza
Na dan liječenja ne provodite ostale primjene preparatima koji sadrže fluorid.
Obustaviti uzimanje fluoridnih tableta nekoliko dana nakon tretiranja fluoridnim lakom.
Lak se ne smije progutati.

Doziranje
Liječenje pacijenata s mliječnom denticijom cca. 0,25 ml fluoridnog laka.
Liječenje pacijenata s mješovitom ili trajnom denticijom cca. 0,40 ml fluoridnog laka.
Nanesite tanki film fluoridnog laka na strukturu zuba. Deblji film se lako otopi i nema terapeutske prednosti. Iskustvo je pokazalo potrebu od 0,25 ml i 0,40 ml za cjelovito zubalo.

Primjena
Površine za tretiranje temeljito očistite od kamenca.
Za bolji rezultat uklonite prekomjernu vlagu/slinu s površine za tretiranje.
Ravnomjerno nanesite fluoridni lak tako da je cijela površina prekrivena tankim filmom.
Navlažite područje primjene (laganim ispiranjem ili prirodnom slinom) kako biste zajamčili vezanje fluoridnog laka.
Pacijente je potrebno uputiti u to da 4 sata nakon tretiranja izbjegavaju hranu i alkohol te čišćenje zubi i korištenje zubnog konca.

Skladištenje i rok trajanja
Skladišliti na 4 °C - 23 °C. Ne koristite nakon isteka datuma trajanja.

Zastupnik u Hrvatskoj: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7 a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834

HU Használati utasítás
Lunos® Fluorid lakk

22600 ppm fluoriddal / 1 ml készítmény 50 mg fluoridot tartalmaz (REF: CPZ030A0150)

Fluorid tartalmú lakk zománc- és dentin felületek deszenzibilizálására. A Fluorid lakk megtapad a nedves felületeken és jól tűri a nedvességet és a nyálat. Alapját etanol tartalmú szuszpenzió alkotja, amely kolofóniumot, ill. mesterséges aromát és xilitolt tartalmaz.

Figyelem
A Fluorid lakk orvostechnikai termék. A termék kizárólag professzionális fogorvosi használatra rendeltetett és kizárólag szakszemélyzet által használható!

Indikációk
A Fluorid lakk a hiperérzékeny fogak kezelésére, védelmére és dentintubulusok lezárására szolgál preparált pulpaüregek vagy érzékeny gyökérfelületek esetén.

Figyelmeztetések
A Fluorid lakk kolofóniumot tartalmaz. A Fluorid lakk ezen összetevője szembeni ismert túlérzékenység (allergia) esetén a használat ellenjavallt. A kolofónium befolyással lehet a kompozitok polimerizációjára és tapadására. Felhasználási céljának megfelelően a Fluorid lakk állaga ragacsos. A tubus használatakor anyagmaradványok rakódhatnak le a meneten, amelyek a csavaros kupak odaragadásához vezethetnek. Adott esetben törölje le a szennyeződéseket egy etanol tartalmú kendővel. A Fluorid lakk nem használható fekélyes foginy- vagy szájnyálkahártya-gyulladásban szenvedő pácienseknél. A Fluorid lakk nem alkalmas szisztémás kezelésre. A használat során ritkán számoltak be ödémás duzzanatokról, főként a nagyobb felületeken történő alkalmazást követően. Hasonló készítményeknél igen ritkán számoltak be légszomjról asztmás gyerekek esetében. Az érzékeny emésztőrendszerű pácienseknél hányinger jelentkezhet teljeskörű kezelést követően. Túlérzékenység esetén: Távolítsa el a lakkot egy puha fogkefével és fogselyemmel, majd meleg vízzel öblítsen.

Óvintézkedések
A kezelés napján ne végezzen további kezeléseket fluorid tartalmú készítményekkel.
A Fluorid lakkal történő kezelést követően hagyjon ki egy napot a fluorid tabletta bevételével.
Ne nyelje le a lakkot.

Adagolás
Elsődleges fogazattal rendelkező páciensek kezelésekor kb. 0,25 ml Fluorid lakk használata javasolt.
Vegyes vagy állandó fogazattal rendelkező páciensek kezelésekor kb. 0,40 ml Fluorid lakk használata javasolt.
Vigyen fel egy vékony Fluorid lakk filmréteget a fogszerkezetre. A vastag filmréteg könnyen leválik és nem nyújt terápiás előnyöket. Tapasztalatok szerint a teljes fogazathoz 0,25 ml és 0,40 ml közötti mennyiségű anyag szükséges.

Alkalmazás
Alaposan tisztítsa meg fogkövektől a kezelendő felületet.
A jobb eredmény érdekében, távolítsa el teljesen a felesleges nedvességet/nyálat a kezelendő felületről.
Egyenletesen vigye fel a Fluorid lakkot úgy, hogy a teljes felületet vékony film borítsa.
A Fluorid lakk megkötését elősegítendő, nedvesítse be az alkalmazási területet (enyhe öblítés vagy természetes nyáltermelés révén).
Tájékoztassa a pácienseket, hogy a kezelést követően legalább 4 órán át kerülendő a szilárd élelmiszer, az alkohol fogyasztása, a fogak tisztítása, valamint a fogselyem használata.

Tárolás és eltarthatóság
Tárolási hőmérséklet: 4 °C - 23 °C. Ne használja a lejárati idő után.

Magyarországi forgalmazó: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7 a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834

EE Kasutusjuhend
Lunos® Fluoriidlakk

22600 ppm fluoriidi / 1 ml sisaldab 50 mg naatriumfluoriidi (REF: CPZ030A0150)

Fluoriidisisaldusega lakk hamba desensibiliseerimiseks, emaili ja dentiini raviks. Fluoriidlakk kinnitub niiskele pealispinnale ning talub niiskuse jääke ja sülge. See baseerub etanooli suspensioonil, mis koosneb kunstliku lõhnaainega kampolist ja ksilitoolsust.

Tähelepanu
Fluoriidlakk on meditsiinitoode. See toode on mõeldud kasutamiseks üksnes hambaarstide poolt ja on ette nähtud üksnes kutselistele kasutajatele!

Näidustused
Fluoriidlakki kasutatakse ülitundlike hammaste raviks ja kaitseks ning dentiini kanalite plommimiseks hambaaukude ettevalmistamisel või tundliku hambajuure pealispinna korral.

Hoiatused
Fluoriidlakk sisaldab kampolit. Fluoriidlakki ei tohi kasutada teadaoleva ülitundlikkuse korral mõne koostisaine suhtes. Kampol võib kahjustada polümeerimist ja kompositiite seondumist. Kasutusviisi kohaselt on fluoriidlakk kleepuva konsistentsiga. Kanalite kasutamisel võivad materjalijäägid keerul kaane kinni kleepida. Sellisel juhul eemaldage mustus etanooli sisaldava lapiga. Fluoriidlakki ei tohi kasutada patsientidel, kellel on haavanditega igemed või suulimasketa põletik. Fluoriidlakk ei ole mõeldud süsteemseks raviks. Harva on kirjeldatud paistetusi, eriti suuremal pinnal kasutamise korral. Võrreldavate preparaatide korral kirjeldati väga harva astmahaigete laste hingeldamist. Tundliku seedetraktiga patsientidel võib pärast ulatuslikku ravi esineda iiveldust. Ülitundlikkuse korral: eemaldage lakk pehme hambaharjaga ja -niidiga ning loputage suu sooja veega.

Ettevaatusabinõud
Ärge kasutage ravipäeval teisi fluoriidi sisaldusega preparaate.
Ärge manustage fluoriidtablette paari päeva jooksul pärast ravi fluoriidlakiga.
Ärge neelake lakki alla.

Annustamine
Piimahammastega patsientide ravis u 0,25 ml fluoriidlakki.
Vahetuvate hammastega või püsihammastega patsientide ravis u 0,40 ml fluoriidlakki.
Kandke õhuke kiht fluoriidlakki hambakõvakoele. Paks kiht eemaldub kergelt ning ei anna raviks eeliseid. Kogemused on näidanud, et kõigi hammaste puhul läheb vaja 0,25 kuni 0,40 ml lakki.

Kasutamine
Puhastage ravitav pind põhjalikult hambakivist.
Parema tulemuse saamiseks eemaldage ravitavalt pinnalt täielikult üleliigne niiskus/sülg.
Kandke fluoriidlakk peale nii, et kogu pealispind oleks ühtlaselt õhukese kihiga kaetud.
Fluoriidlaki kinnistumiseks niisutage kohaldamisala (kas pinda õrnalt loputades või loomuliku süljevoolusega).
Patsientidele tuleb rõhutada, et 4 tunni jooksul pärast ravi ei tohi süüa, tarbida alkoholi, hambaid pesta ega kasutada hambaniiti.

Hoiustamine ja säilivus
Hoiustamine temperatuuril 4–23°C. Ärge kasutage pärast kõlblikkusaja lõppu.

LV Lietošanas instrukcija
Lunos® fluorīda laka

satur 22600 ppm fluorīda / 1 ml satur 50 mg nātrija fluorīda (REF: CPZ030A0150)

Fluorīdu saturoša laka zobu jutības mazināšanai emaljas un dentīna virsmām. Fluorīda laka sacietē uz mitrām virsmām, un to var klāt uz mitrām un ar siekalām pārklātām virsmām. Laka ir veidota uz spirta suspensijas bāzes no sveķiem ar mākslīgu aromātvielu un ksilītu.

Uzmanību
Fluorīda laka ir medicīniska izstrādājums. Šis izstrādājums ir paredzēts profesionālai lietošanai zobārstniecībā, un to drīkst izmantot tikai speciālisti!

Indikācijas
Fluorīda laka ir paredzēta īpaši jutīgu zobu apstrādei un aizsardzībai, kā arī zobu kanālu aizpildīšanai dobumu sagatavošanas laikā vai jutīgu saknu virsmu gadījumā.

Drošības norādījumi
Fluorīda laka satur sveķus. Ja ir zināma paaugstināta jutība (alerģija) pret šo fluorīda lakas sastāvdaļu, nelietojiet šo izstrādājumu. Sveķi var ietekmēt kompozīta polimerizāciju un cietēšanu. Atbilstoši lietošanas mērķim fluorīda laka ir lipīgas konsistences. Izmantojot tūbiņu, uz uzskrūvējamā vāciņa var palikt materiāls, kā rezultātā vāciņš var pielipt. Materiāla pārpalikumus noslaukiet ar spirtu saturošu dīvānu. Fluorīda laku nedrīkst lietot pacientiem ar smaganu čūlām vai mutes gļotādas iekaisumu. Fluorīda laka nav paredzēta sistēmiskai lietošanai. Reti ir ziņots par ādas tūsku, īpaši pēc lietošanas uz lielākas platības virsmām. Līdzīgiem preparātiem ļoti reti tika ziņots par elpas trūkumu bērniem ar astmu. Pacientiem ar jutīgu gremošanas sistēmu pēc intensīvas procedūras var rasties slikta dūša. Paaugstinātas jutības gadījumā noņemiet laku ar mīkstu zobu birsti un zobu diegu, kā arī noskalojiet ar siltu ūdeni.

Piesardzības pasākumi
Procedūras dienā nedrīkst izmantot vēl citus fluorīdu saturošus līdzekļus.
Vairākas dienas pēc fluorīda lakas uzklāšanas nelietojiet fluorīda tabletes.
Laku nedrīkst norīt.

Devas
Pacientiem ar piena zobiem: apm. 0,25 ml fluorīda lakas.
Pacientiem, kam zobi mainās vai ir pastāvīgie zobi: apm. 0,40 ml fluorīda lakas.
Uz āstējošās vielas uzklājiet plānu slāni fluorīda lakas. Uzklājot biezu slāni, tas viegli lobās un nenodrošina ārstniecisku iedarbību. Saskaņā ar novērojumiem pilnam sakodienam nepieciešamā deva ir 0,25–0,40 ml.

Lietošana
Apstrādājamā virsma ir rūpīgi jāattīra no zobakmens.
Lai iegūtu labāku rezultātu, no apstrādājamās virsmas pilnībā noņemiet lieko šķidrumu/siekalas.
Vienmērīgi uzklājiet fluorīda laku, lai visa virsma būtu pārklāta ar plānu slāni.
Samitrināt apstrādāto vietu (viegli skalojot vai dabiski ar siekalām), lai veicinātu lakas sacietēšanu.
Pacienti ir jāinformē, ka 4 stundas pēc procedūras nedrīkst lietot cietu ēdienu, alkoholu, kā arī nedrīkst mazgāt zobus un lietot zobu diegu.

Uzglabāšana un derīguma termiņš
Glabāt 4–23 °C temperatūrā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

LT Naudojimo instrukcija
„Lunos®“ fluorido lakas

su 22600 ppm fluorido / 1 ml vra 50 mg natrio fluorido (REF: CPZ030A0150)

Lakas, kurio sudėtyje yra fluorido, skirtas dantų jautrumui mažinti ir dantų emalei bei dentinui gydyti. Fluorido lakas prikimba prie drėgnų paviršių ir toleruoja drėgmės bei seilių likučius. Jo pagrindas yra etanolio suspensija iš kanifolio su dirbiniu aromatu ir ksilitolio.

Dėmesio
Fluorido lakas yra medicininis produktas. Šis produktas skirtas tik profesiniam naudojimui odontologijoje ir jį leidžiama naudoti tik kvalifikuotam personalui!

Indikacijos
Fluorido lakas skirtas ypač jautriems dantims gydyti ir apsaugoti bei dentino tubulėms padengti preparuojant skylutes arba jautrius šaknų paviršius.

Įspėjamieji nurodymai
Fluorido lako sudėtyje yra kanifolio. Esant žinomam dideliam jautrumui (alergijai) šiai fluorido lako sudėtinei medžiagai, fluorido lako nenaudoti. Kanifolis gali neigiamai paveikti polimerizaciją ir kompozitų prikibimą. Fluorido lakas yra lipnios konsistencijos, ką ir atitinka jo naudojimo tikslas. Naudojant tūtelę, ant užsukamo paviršiaus dėl medžiagos likučių gali prilipti dangtelis. Galimus nešvarumus nuvalykite šluoste su etanoliu. Fluorido lako negalima naudoti pacientams su opiniais dantenų arba burnos gleivinės uždegimais. Fluorido lakas neskirtas sisteminiam gydymui. Retais atvejais buvo stebimi paburkę tinimai, ypač po naudojimo didesniuose plotuose. Naudojant panašius preparatus, labai retais atvejais buvo stebimas astma sergančių vaikų dusulys. Gydant pacientus su jautria virškinimo sistema, po ilgesnio gydymo galimas pykinimas. Esant ypač dideliam jautrumui: pašalinkite laką minkštu dantų šepetėliu ir siūlu, tada nuplaukite šiltu vandeniu.

Atsargumo priemonės
Gydymo dieną nenaudoti jokių kitų preparatų, kurių sudėtyje yra fluorido.
Po gydymo fluorido laku kelias dienas nutraukti fluorido tabletių vartojimą.
Nenuryti lako.

Dozavimas
Pacientams su pieniniais dantimis – apie 0,25 ml fluorido lako.
Pacientams su besikeičiančiais arba nuolatiniais dantimis – apie 0,40 ml fluorido lako.
Užtepkite ant kieto danties paviršiaus ploną fluorido lako plėvelę. Stora plėvelė greitai nusiplins ir neturės gydomojo poveikio. Kaip rodo patirtis, visiems dantims reikalingas kiekis yra nuo 0,25 ml iki 0,40 ml.

Naudojimas
Nuo gydomo paviršiaus kruopščiai nuvalykite dantų akmenis.
Geresniam rezultatui nuo gydomo paviršiaus visiškai pašalinkite drėgmės / seilių perteklių.
Tolygiai užtepkite fluorido lako. kad visas paviršius būtų padengtas plona plėvele.
Sriti, kuriuje naudosite, sudrėkinkite (arba šiek tiek nuplaukite, arba natūraliomis seilėmis), kad fluorido lakas susirištų.
Pacientams būtina nurodyti, kad 4 valandas po apdorojimo vengti kieto maisto, alkoholio, stengtis nevalyti dantų ir nenaudoti dantų siūlo.

Laikymas ir tinkamumo naudoti laikas
Laikymas 4–23 °C.temperatūroje. Pasibaigus galiojimo laikui, nebenaudoti.

RU Руководство по эксплуатации
Lunos® Фторсодержащий лак

Фторид в концентрации 22600 мг/кг/1 мл содержит 50 мг фтористого натрия (референтный номер: CPZ030A0150)

фторсодержащий лак для снижения чувствительности зубов и для обработки поверхностей эмали и дентина. Фторсодержащий лак схватывается на влажных поверхностях, наличие остатков влаги и слюны не является препятствием. Его основой является спиртовая суспензия из канифоли с искусственным ароматом и ксилита.

Внимание
Фторсодержащий лак является медицинским изделием. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального стоматологического применения; к его использованию допускаются только специалисты!

Показания к применению
Фторсодержащий лак предназначен для лечения и защиты слишком чувствительных зубов и для герметизации чувствительной поверхности корней или дентинных каналъцев при препарировании кариозных полостей.

Предупредительные указания
В состав фторсодержащего лака входит канифоль. При наличии известной реакции повышенной чувствительности (аллергии) на этот компонент фторсодержащего лака от использования лака необходимо отказаться. Канифоль может отрицательно повлиять на полимеризацию и схватывание фотокомпозита. В соответствии со своим назначением фторсодержащий лак имеет вязкую консистенцию. При использовании тюбика остатки материала на резьбе завинчивающейся крышки могут привести к тому, что крышка приклеится. При необходимости удалите загрязнения салфеткой, пропитанной этанолом. Не используйте фторсодержащий лак при наличии у пациента язвенных воспалений десен или стоматита. Фторсодержащий лак не предназначен для системного лечения. В редких случаях сообщалось об отечных явлениях, в особенности после применения на больших поверхностях. При применении похожих препаратов в редких случаях сообщалось о затруднении дыхания у детей с астмой. У пациентов с чувствительной пищеварительной системой после нанесения лака на большие участки возможна тошнота. При повышенной индивидуальной чувствительности удалите лак с помощью мягкой зубной щетки и зубной нити, после этого прополоскайте теплой водой.

Меры предосторожности
В день нанесения лака не проводите больше никаких процедур с использованием фторсодержащих препаратов.
После обработки фторсодержащим лаком следует на несколько дней отменить прием фторсодержащих таблеток.
Лак нельзя глотать.

Дозировка
Для пациентов с молочными зубами — примерно 0,25 мл фторсодержащего лака.
Для пациентов с меняющимися или постоянными зубами — примерно 0,40 мл фторсодержащего лака.
Нанесите тонкий слой фторсодержащего лака на твердое вещество зуба. Толстая пленка лака быстро начнет отслаиваться и не дает никаких терапевтических преимуществ. Как показывает опыт, для обработки всех зубов требуется от 0,25 мл до 0,40 мл лака.

Способ применения
Обрабатываемую поверхность следует тщательно очистить от зубного камня.
Для достижения лучшего результата полностью удалите лишнюю влагу/слюну с поверхности, на которую вы собираетесь наносить лак.
Нанесите фторсодержащий лак равномерно, так чтобы вся поверхность была покрыта тонкой пленкой.
Увлажните область нанесения лака (либо слегка сполоснув водой, либо за счет естественного слюнотечения), чтобы обеспечить схватывание фторсодержащего лака.
Пациентам следует указать на то, что в течение 4 часов после нанесения лака следует воздержаться от приема твердой пищи, алкоголя, чистки зубов и использования зубной нити.

Хранение и срок годности
Хранить при температуре 4 °C–23 °C. Не использовать после истечения срока годности.

BG Упътване за употреба
Lunos® флуориден лак

с 22600 ppm флуорид/1 мл съдържа 50 mg натриев флуорид (REF: CPZ030A0150)

съдържащ флуорид лак за десенсибилизация на зъбите за обработване на емайлови и дентинови повърхности. Флуориденият лак се задържа на влажни повърхности и толерира остатъци от влага и слюнка. Той е на основата на етанолова суспензия от изкуствено ароматизиран колофон и ксилитол.

Внимание
флуориденият лак е медицински продукт. Този продукт е предназначен само за професионална употреба от стоматолози и трябва да се използва само от специалисти.

Указания
Флуориденият лак служи за лечение и защита на свръхчувствителни зъби и за запечатване на дентинови каналчета при препариране на кавитет или чувствителни коренови повърхности.

Предупредителни указания
Флуориденият лак съдържа колофон. При известна свръхчувствителност (алергии) към тази съставка на флуориденият лак той не трябва да се използва. Колофонът може да наруши полимеризацията и адхезията на композитите. В съответствие с целта на приложение флуориденият лак има лепкава консистенция. При използване на тубата остатъци от материала върху резбата могат да доведат до залепване на капачката. При необходимост избършете замърсяванията със съдържаща спирт кърпа. Флуориденият лак не трябва да се прилага при пациенти с улцерозни възпаления на венците и устната лигавица. Флуориденият лак не е предназначен за системно лечение. Рядко се съобщава за едематозни отоци, особено след приложение върху по-големи повърхности. При съпоставими препарати много рядко се съобщава за дихателен дистрес при деца с астма. При пациенти с чувствителна храносмилателна система е възможно след обширно обработване да се появи гадене. При свръхчувствителност: отстранете лака с мека четка за зъби и конец за чистене на зъби, след това изплакнете с топла вода.

Предпазни мерки
В деня на лечението не използвайте никакви други препарати, съдържащи флуорид.
След обработване с флуориден лак няколко дни спрете приемането на таблетки флуорид.
Не гълтайте лака.

Дозировка
Лечение на пациенти с млечни зъби около 0,25 мл флуориден лак.
Лечение на пациенти със сменени зъби или постоянни зъби около 0,40 мл флуориден лак.
Нанесете тънък слой флуориден лак върху твърдата зъбна субстанция. Дебелият слой лесно се отстранява и не предлага терапевтични предимства. Опитът показва, че необходимият разход за всички зъби е между 0,25 мл и 0,40 мл.

Приложение
Почистете основно повърхността за обработване от зъбен камък.
За по-добър резултат отстранете излишната влага/слюнка от обработваната повърхност.
Нанесете флуориденият лак равномерно така, че цялата повърхност да се покрие с тън