

CZ:

Velodes® Soft

Kapalný alkoholový přípravek pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou

- S obsahem ochranných kosmetických složek
- Dermatologicky testováno
- Příjemná vůně

Alkoholový přípravek určený k hygienické (HDR) a chirurgické (CHDR) dezinfekci rukou. Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní (*C. albicans*), tuberkulocidní, omezeně virucidní (Rota virus, obalené viry vč. Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV).

Návod k použití: Přípravek se používá neředěný. Naneste jej rovnoměrně, v dostatečném množství na ruce a pečlivě rozetřete (viz metodický pokyn pro dezinfekci rukou). Ponechte působit po předepsanou expoziční dobu. Ruce musí být po celou dobu působení přípravku vlhké.

Hygienická dezinfekce rukou (dle EN 1500): vtírejte dostatečné množství přípravku do suchých, čistých rukou po dobu 30 sekund. Chirurgická dezinfekce rukou (dle EN 12791): vtírejte dostatečné množství přípravku do suchých, čistých rukou po dobu 90 sekund.

Přípravek má prodloužený remanentní účinek u CHDR po dobu 3 hodin. **Pouze pro profesionální použití.** Používejte biocid bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte příložené pokyny.

Mikrobiologická účinnost (nízké znečištění): • baktericidní dle EN 13727 - 30 s, 60 s (vyšší znečištění) • fungicidní (*C. albicans*) dle EN 1275 - 30 s, dle EN 13624 - 30 s • tuberkulocidní (*M. terrae*) dle EN 14348 - 30 s • obalené viry (Vaccinia, BVDV, vč. HBV, HCV, HIV, chřipkové viry aj.) dle EN 14476 - 30 s • Rota virus dle EN 14476 - 45 s

Obsah účinné látky ve 100 g přípravku: 60 g propan-2-ol, 0,5 g chlorhexidin diglukonát

Bezpečnostní upozornění: Obsahuje isopropanol (CAS: 67-63-0).

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H226: Hořlavá kapalina a páry. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li k nasazení a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P370 + P378: V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj typu ABC. P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501: Odstraňte obsah/ obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu resp. zbytkovými obaly. Složky dle nařízení (ES) č. 648/2004: datový list složek naleznete na stránkách výrobce. Skladujte a přepravujte v originálním obalu, v temnu a suchu při teplotě od +5 do +25°C. Chraňte před mrazem. Nesměšujte s jinými výrobky. Produkt neodstraňujte do odpadních vod. Prázdné a uzavřené obaly předejte k zneškodnění osobě oprávněné k nakládání s odpady. Nespotřebované zbytky přípravku: viz bezpečnostní list. Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při zasažení očí: Ihned vypláchněte čistou vlahou tekoucí vodou, vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování dalších 15 minut. Při požití: vypláchněte ústa velkým množstvím vody, dejte pít jednu až dvě sklenice vody po malých doušcích a nevyvolávejte zvracení. Při podráždění kůže: důkladně opláchněte vodou. Při masivním nadýchání: dopravte postiženého na čerstvý vzduch dokud nevolnost a závratě nezmizí. Při přetrvávajících obtížích vždy vyhledejte neprodleně lékaře. **Minimální trvanlivost:** 36 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní list přípravku naleznete na www.medissept.pl

Možné přímé a nepřímé vedlejší účinky: V případě opakované, dlouhodobé expozice nebo v koncentracích nad mezními hodnotami přípustné expozice na pracovišti se mohou objevit vedlejší účinky na zdraví v závislosti na způsobu expozice: Styk s kůží a očima (akutní účinek): Způsobuje vážné podráždění očí. Expoziční čas pro toxicitu pro specifické cílové orgány (STOT): Vystavení vysokým dávkám může nepříznivě ovlivnit nervový systém, který způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, závratě, ospalost, zvracení a v závažných případech může vést k bezvědomí.

Varování





MEDISEPT Sp. z o.o., Konopnica 159 c, , 21-030 Motycz, Polska, tel + 48 81 535 22 22

www.medisept.pl

Distributor: Perfect Distribution a.s., U Spalocvny 4582/17, 79601 Prostějov, tel.: +420 582 400 000

<https://perfectdistribution.agel.cz>

Číslo šarže (LOT):

Exspirace:

Balení: 250ml sprej, 500ml láhev, 500ml láhev s pumpičkou, 1L láhev, 1L plastový sáček do dávkovače, 5L kanystr