

CZ:

Velodes® Gel

Čirý gel pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.

Účinek na Rota a Noro viry již od 30 sekund.

- Nelepí, bez parfemace
- S obsahem ochranných kosmetických složek
- Dermatologicky testováno

Čirý gelový přípravek pro hygienickou (HDR) a chirurgickou (CHDR) dezinfekci rukou. Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní (*C. albicans*), tuberkulocidní, omezeně virucidní (Rota a Noro viry, obalené viry vč. Vaccinia, BVDV, HBV, HCV, HIV).

Návod k použití: Přípravek se používá neředěný. Naneste jej rovnoměrně, v dostatečném množství na ruce a pečlivě rozetřete (viz metodický pokyn pro dezinfekci rukou). Ponechte působit po předepsanou expoziční dobu. Ruce musí být po celou dobu působení přípravku vlhké.

Hygienická dezinfekce rukou (dle EN 1500): vtírejte- dostatečné množství přípravku do suchých, čistých rukou po dobu 30 sekund. Chirurgická dezinfekce rukou (dle EN 12791): vtírejte dostatečné množství přípravku do suchých, čistých rukou po dobu 3 minut.

Pouze pro profesionální použití.

Používejte biocid bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte přiložené pokyny.

Mikrobiologická účinnost (vyšší znečištění): • baktericidní dle EN 13727 - 30 s • fungicidní (*C. albicans*) dle EN 13624 - 15 s • tuberkulocidní (*M. terrae*) dle EN 14348 - 30 s • obalené viry (vč. Vaccinia, HBV, HCV, HIV) dle EN 14476 - 30 s*, 60 s • BVDV virus dle EN 14476 - 30 s • Rota virus dle EN 14476 - 30 s*, 60 s. • Noro virus dle EN 14476 - 30 s (* nízké znečištění).

Obsah účinné látky ve 100 g přípravku: 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol.

Bezpečnostní upozornění: H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H226: Hořlavá kapalina a páry.

P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření. P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze

vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P370 + P378: V případě požáru: K uhašení použijte

práškový hasicí přístroj typu ABC. P501: Odstraňte obsah/ obal v souladu s platnými právními

předpisy pro třídění obalu resp. zbytkovými obaly- Složky dle nařízení (ES) č. 648/2004: datový list složek naleznete na stránkách výrobce. Skladujte a přepravujte v originálním obalu, v temnu a suchu při teplotě od +5 do +25°C. Chraňte před mrazem. Nesměšujte s jinými výrobky. Produkt neodstraňujte do odpadních vod. Prázdné a uzavřené obaly předejte k zneškodnění osobě oprávněné k nakládání s odpady. Nespoteřované zbytky přípravku: viz bezpečnostní list. Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při zasažení očí: Ihned vypláchněte čistou vlahou tekoucí vodou, vyjměte kontaktní čočky jsou-li nasazeny a lze je vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování dalších 15 minut. Při požití: vypláchněte ústa velkým množstvím vody, dejte pít jednu až dvě sklenice vody po malých doušcích a nevyvolávejte zvracení. Při podráždění kůže: důkladně opláchněte vodou. Při masivním nadýchání: dopravte postiženého na čerstvý vzduch dokud nevolnost a závratě nezmizí. Při přetrvávajících obtížích vždy vyhledejte neprodleně lékaře. **Minimální trvanlivost**: 36 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní list přípravku naleznete na www.medisep.pl

Možné přímé a nepřímé vedlejší účinky: V případě opakované, dlouhodobé expozice nebo požití v koncentracích nad mezními hodnotami expozice na pracovišti, se mohou objevit vedlejší účinky na zdraví v závislosti na způsobu expozice: Styk s kůží a očima (akutní účinek): Styk s očima: Při kontaktu s očima způsobuje jejich poškození.

Varování



MEDISEPT Sp. z o.o., Konopnica 159 c, , 21-030 Motycz, Polska, tel + 48 81 535 22 22

www.medisep.pl

Distributor: Perfect Distribution a.s., U Spalocvny 4582/17, 79601 Prostějov, tel.: +420 582 400 000

<https://perfectdistribution.agel.cz>

Číslo šarže (LOT):

Expirace:

Balení: 500ml láhev, 500ml láhev s pumpičkou, 1L plastový sáček do dávkovače