

UNIDEM - Ultrasound Gel

Gel je určen k provádění ultrasonografických a fyzioterapeutických vyšetření na vnějším povrchu těla.

Výrobek může být používán k transvaginálnímu nebo transrektálnímu vyšetření pod podmínkou, že bude použit návlek na sondu a preparát bude aplikován tak, aby neměl přímý kontakt se sliznicí.

Není určen k vnitřnímu užití a nedoporučuje se používat s defibrilátorem. Je rozpustný ve vodě a je hypoalergický.

Gel může způsobit podráždění a zarudnutí pokožky u lidí precitlivělých na konzervační látky (v těchto případech umýt vlažnou vodou a utřít papírovým ručníkem). Pokud se výrobek dostane do očí, může způsobit jemné podráždění, slzení a zarudnutí spojivky (umýt spojivkový váček fyziologickým roztokem)

Předpokládá se používání školeným zdravotnickým personálem.

Způsob užití: Nanést přiměřenou vrstvu (1- 2 mm) na vyšetřované místo těla. Následně provést vlastní vyšetření v souladu s návodem na použití daného přístroje. Bezprostředně po provedeném vyšetření setřít gel z těla a zařízení ručníkem nebo utěrkou.

Složení: dejonizovaná voda, karbomer, triethanolamine, monopropylénový glykol, 5-chloro-2methyl-4-izothiazolin-3-one, 2-methyl-4-izothiazolin-3-one.

Skladování: **Gel skladujte v temnu při pokojové teplotě.** Při teplotě nižší než -4 st. C může gel zmrznout. Po rozmrznutí nelze přípravek znovu použít. Pod vlivem přímého UV záření se přípravek může rozložit (zhnědne).

Výrobce: UNIDEM Ltd SK, Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

UNIDEM - Ultrasound Gel

Gel je určen k provádění ultrasonografických a fyzioterapeutických vyšetření na vnějším povrchu těla.

Výrobek může být používán k transvaginálnímu nebo transrektálnímu vyšetření pod podmínkou, že bude použit návlek na sondu a preparát bude aplikován tak, aby neměl přímý kontakt se sliznicí.

Není určen k vnitřnímu užití a nedoporučuje se používat s defibrilátorem. Je rozpustný ve vodě a je hypoalergický.

Gel může způsobit podráždění a zarudnutí pokožky u lidí precitlivělých na konzervační látky (v těchto případech umýt vlažnou vodou a utřít papírovým ručníkem). Pokud se výrobek dostane do očí, může způsobit jemné podráždění, slzení a zarudnutí spojivky (umýt spojivkový váček fyziologickým roztokem)

Předpokládá se používání školeným zdravotnickým personálem.

Způsob užití: Nanést přiměřenou vrstvu (1- 2 mm) na vyšetřované místo těla. Následně provést vlastní vyšetření v souladu s návodem na použití daného přístroje. Bezprostředně po provedeném vyšetření setřít gel z těla a zařízení ručníkem nebo utěrkou.

Složení: dejonizovaná voda, karbomer, triethanolamine, monopropylénový glykol, 5-chloro-2methyl-4-izothiazolin-3-one, 2-methyl-4-izothiazolin-3-one.

Skladování: Gel skladujte v temnu při pokojové teplotě. Při teplotě nižší než -4 st. C může gel zmrznout. Po rozmrznutí nelze přípravek znovu použít. Pod vlivem přímého UV záření se přípravek může rozložit (zhnědne).

Výrobce: UNIDEM Ltd SK, Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

