

**DE** Lunos® Prophylaxepulver Perio Combi

**EN** Lunos® Prophylaxis Powder Perio Combi

**FR** Lunos® Poudre prophylactique Perio Combi

**IT** Lunos® Polvere per la profilassi Perio Combi

**ES** Lunos® Polvo profiláctico Perio Combi



## DE Gebrauchsanweisung

### Lunos® Prophylaxepulver Perio Combi

Prophylaxepulver Perio Combi (REF: CPZ640A1950)

**Achtung:** Prophylaxepulver Perio Combi ist ein Medizinprodukt. Dieses Produkt ist nur für die professionelle zahnärztliche Anwendung bestimmt und darf ausschließlich von Fachpersonal angewendet werden! Das „Prophylaxepulver Perio Combi“ ist vornehmlich zur sub- und supragingivalen Anwendung in handelsüblichen Pulverstrahlgeräten bestimmt. Bitte beachten Sie vor der Verwendung des Prophylaxepulvers die Gebrauchsanweisung Ihres Pulverstrahlgerätes.

#### Anwendung

Dieses Produkt wird empfohlen für:

- Entfernung von parodontalem Biofilm im Rahmen der parodontalen Erhaltungstherapie (Recalltherapie), nach erfolgter Initialtherapie, bei einer Taschentiefe bis zu 10 mm.
- Implantatreinigung, bzw. Periimplantitisstherapie nach erfolgter Initialtherapie
- Schonende Plaqueentfernung im Sulkusbereich und an besonders empfindlichen Zahnoberflächen.
- Entfernung von leichten Verfärbungen im supragingivalen Bereich
- Zur Entfernung von Plaque auf kieferorthopädischen Apparaturen (Brackets)

#### Kontraindikation

Patienten die an chronischen Atemwegserkrankungen (z.B. Bronchitis oder Asthma) leiden, dürfen nicht mit einem Pulver-Wasserstrahlgerät behandelt werden, da das im Aerosol befindliche Pulver zu Atemwegsschwierigkeiten führen kann. Ebenso sollte die Anwendung auf nicht intaktem Schmelz sowie hypomineralisiertem Schmelz und „White Spots“ unterbleiben.

Bitte bedenken Sie dass die Behandlung tiefer parodontaler Taschen zu einer Bakteriämie führen kann. Daher muss vor der Behandlung eines Risikopatienten (Endokarditispatient, Schwangere, stillende Mütter, ansteckende Krankheiten, Immunschwächen: Neutropenie, Angrenulose, Diabetes, Hämophilie, Patienten unter Behandlung: Strahlentherapiepatienten, Chemotherapiepatienten und Patienten während einer Antibiotikatherapie) die hierfür notwendige Maßnahme getroffen werden.

Bitte achten Sie darauf, dass der Strahl des Pulverstrahlgeräts nicht direkt auf festsitzenden Zahnersatz und Füllungen ausgerichtet wird, da so Restaurationen beschädigt werden könnten.

#### Arbeitsvorbereitung

- Bitte entfernen Sie Pulverreste aus der Pulverkammer des Pulverstrahlgerätes vor der erneuten Befüllung mit Prophylaxepulver Perio Combi
- Schütteln Sie die verschlossene Flasche, bevor Sie das Prophylaxepulver Perio Combi entnehmen.
- Bitte entfernen Sie vor Entnahme des Pulvers das Flaschensiegel. Entfernen Sie zu diesem Zweck den Deckel der Fla-

- sche vollständig, ziehen Sie das Siegel ab und schrauben anschließend den Deckel der Flasche wieder vollständig auf.
- Bitte achten Sie vor Befüllen der Pulverkammer dringend darauf, dass diese vollständig trocken ist. Es darf keine Restfeuchtigkeit, z.B. von Aufbereitungsmaßnahmen, in der Kammer vorhanden sein.
- Bitte achten Sie dringend darauf, beim Einfüllen des Pulvers in die Pulverkammer, die maximale Füllhöhe der Pulverkammer nicht zu überschreiten.
- Klappen Sie den „Kipphebel“, vollständig nach oben oder schrauben Sie den Verschluss der Flasche vollständig ab. Zur minimalen Staubentwicklung beim Befüllen der Kammer wird empfohlen hierzu den „Kipphebel“ zu benutzen und die Flasche nur leicht zusammen zu drücken.

#### Behandlungsempfehlung

Patient und Behandler müssen einen geeigneten Augenschutz, z.B. Schutzbrille tragen. Der Behandler muss geeignete Schutzausrüstung, in Form von Mund- Nasenschutz und geeigneten Schutzhandschuhen tragen.

Verwenden Sie eine geeignete Spraynebelabsaugkanüle z.B. die Dürr Dental Prophylaxe Kanüle. Richten Sie die Strahldüse während der Behandlung nicht direkt auf das Zahnfleisch. Die direkte Bestrahlung des Weichgewebes kann zu einer Schädigung des Zahnfleisches führen. Außerdem besteht die Gefahr einer Emphysem-Bildung im Gewebe und/oder einer Embolie durch in den Blutkreislauf eingebrachte Luft. Zum Schutz empfindlicher Hautpartien tragen Sie bitte, vor Behandlungsbeginn, Vaseline auf die Lippen des Patienten auf.

Reinigen Sie nach Abschluss der Behandlung das Gesicht des Patienten mit einem feuchten Einmaltuch.

Mit diesem Prophylaxepulver kann kein Zahnstein entfernt werden.

#### Allgemeine Informationen

Dieses Prophylaxepulver wirkt nicht kariogen. Bitte entfernen Sie Prophylaxepulverreste auf Arbeitsoberflächen, Schrankfronten oder Behandlungstischen immer mit einem feuchten Tuch.

#### Hinweis für den Patienten

Weisen Sie Ihren Patienten bitte darauf hin, dass Essen oder Trinken (Tee, Kaffee oder andere Lebensmittel) innerhalb der ersten zwei bis drei Stunden nach der Behandlung zu einer Verfärbung der Zähne führen kann.

#### Lagerung und Haltbarkeit

Nicht über 25 °C und an einem gut belüfteten Ort lagern. Die Haltbarkeit beträgt 30 Monate.

#### Zusammensetzung

Trehalose, Hilfsstoffe

Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL AUSTRIA, Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834

Vertrieb in Schweiz: DÜRR DENTAL SCHWEIZ AG, Grabenackerstrasse 27, 8156 Oberhasli, Switzerland

☎ +41 448850634

## EN Operating Instructions

### Lunos® Prophylaxis Powder Perio Combi

Prophylaxis Powder Perio Combi (REF: CPZ640A1950)

**Notice:** Prophylaxis Powder Perio Combi is a medical device. This product is only intended for professional dental applications and must only be used by trained specialists! “Prophylaxis Powder Perio Combi” is designed mainly for sub- and supra-gingival application in commercial powder jet devices. Please note the operating instructions of the powder jet device before use of the prophylaxis powder.

#### Application

This product is recommended for:

- Removal of periodontal biofilm in the scope of periodontal maintenance therapy (recall therapy) after completed initial therapy for a pocket depth of up to 10 mm.
- Implant cleaning and treatment of peri-implantitis after completed initial therapy
- Gentle removal of plaque at the sulcus and particularly sensitive dental services.
- Removal of slight discolorations in supragingival regions
- Removal of plaque on orthodontic appliances (brackets)

#### Contraindication

Patients suffering from chronic airway diseases (e.g. bronchitis or asthma) must not be treated with a powder-water jet device since the powder present in the aerosol can lead to difficult breathing. Likewise, the product should not be used on non-intact enamel and hypomineralised tooth enamel and “white spots”.

Please take into consideration that the treatment of deep periodontal pockets can lead to bacteraemia. For this reason, suitable measures must be undertaken before treating a risk patient (endocarditis patient, pregnant and lactating women, infectious diseases, immunodeficiency: neutropenia, agranulocytosis, diabetes, haemophilia. Patients on treatment: Radiation therapy patients, chemotherapy patients and patients during antibiotic therapy).

Please make sure not to direct the jet of the powder jet device directly at fixed dental restorations and fillings as this may damage the restorations.

#### Preparation

- Please remove all residual powder from the powder chamber of the powder jet device before refilling it with Prophylaxis Powder Perio Combi
- Shake the closed bottle before removing any Prophylaxis Powder Perio Combi.
- Please remove the seal on the bottle before removing the powder. For this purpose, take the lid off the bottle, pull off the seal and then screw the lid back on the bottle.
- Before filling the powder chamber, make sure that the chamber is completely dry. There must be no residual moisture in the chamber, e.g. from reprocessing measures.

- Filling the powder into the powder chamber, you need to make sure not to exceed the maximum filling level of the powder chamber.
- Fold the “rocker” all the way up or unscrew the lid from the bottle. To minimise the amount of dust generated when you fill the chamber, it is recommended to use the “rocker” for this purpose and to compress the bottle only slightly.

#### Recommendations for treatment

Patient and operator need to wear suitable eye protection, e.g. protective goggles.

The operator needs to wear suitable protective equipment in the form of mouth and nose protection and suitable protective gloves.

Use a suitable spray mist aspiration cannula, e.g. the Dürr Dental Prophylaxis Cannula. Do not direct the spray nozzle directly at the gingiva during the treatment. Direct exposure of the soft tissue may damage the gingiva. Also there's a risk of emphysema arising in the tissue or of embolism from air being introduced into blood circulation.

To protect sensitive skin, please apply Vaseline to the patient's lips before commencing the treatment.

After completion of treatment, clean the patient's face with a moist disposable cloth.

This prophylaxis powder cannot be used remove tartar.

#### General Information

This prophylaxis powder does not have a cariogenic effect. Please make sure to always remove any residual prophylaxis powder from working surfaces, front surfaces of cabinets or treatment units using a moist cloth.

#### Notes for the patient

Please advise your patient that the ingestion of food or beverages (tea, coffee or other food items) within the first two to three hours after completion of the treatment can cause discoloration of the teeth.

#### Storage and shelf life

Store in a well-ventilated place at a temperature not above 25°C. The shelf life of the product is 30 months.

#### Composition

Trehalose, excipients

DÜRR DENTAL (Products) UK Ltd.

14 Linnell Way – Telford Way Industrial Estate

Kettering, Northants NN16 8PS, United Kingdom ☎ +44 1536526740

## FR Notice d'utilisation

### Lunos® Poudre prophylactique Perio Combi

Poudre prophylactique Perio Combi (REF : CPZ640A1950)

**Attention:** La poudre prophylactique Perio Combi est un produit médical. Ce produit est uniquement destiné à un usage professionnel en médecine dentaire et doit être appliqué exclusivement par un personnel qualifié ! La « poudre prophylactique Perio Combi » est avant tout destinée à une application sous-gingivale et supra-gingivale dans des appareils à jet de poudre courants. Avant d'utiliser la poudre prophylactique, veillez à respecter la notice d'utilisation de l'appareil à jet de poudre.

#### Application

Ce produit est recommandé pour:

- le retrait du biofilm parodontal dans le cadre d'un traitement parodontal de conservation (thérapie de soutien) après une thérapie initiale réussie, pour une profondeur de poches allant jusqu'à 10 mm.
- le nettoyage d'implants ou le traitement d'une péri-implantite après une thérapie initiale réussie
- l'élimination en douceur de la plaque au niveau de la poche parodontale et sur les surfaces dentaires particulièrement sensibles.
- l'élimination de légères décolorations dans la zone supra-gingivale
- l'élimination de la plaque dentaire sur les appareillages d'orthodontie (appareils dentaires)

#### Contre-indications

Les patients souffrant de maladies chroniques affectant les voies respiratoires (par ex. bronchite ou asthme) ne doivent pas être traités avec un appareil à jet de poudre et d'eau car la poudre se trouvant dans l'aérosol peut provoquer des difficultés respiratoires. Éviter aussi toute application sur un émail dentaire abîmé ou sur un émail dentaire déminéralisé et « taches blanches ».

Veillez noter que le traitement des poches parodontales profondes peut entraîner une bactériémie. C'est pourquoi, avant de traiter des patients à risques (patients souffrant d'endocardite, femmes enceintes ou en période d'allaitement, maladies contagieuses, immunodéficiences: neutropénie, agranulocytose, diabète, hémophilie, patients sous traitement: patients sous radiothérapie, chimiothérapie, patients sous antibiotiques), il importe de prendre les mesures qui s'imposent.

Veillez noter que le jet de l'appareil à jet de poudre ne doit pas être orienté directement sur une prothèse dentaire fixe ou des plombages car cela pourrait endommager les restaurations.

#### Préparation du travail

- Veillez débarrasser le compartiment à poudre de l'appareil à jet de poudre des résidus de poudre avant de le remplir à nouveau avec la poudre prophylactique Perio Combi
- Agitez le flacon fermé avant d'enlever la poudre prophylactique Perio Combi.
- Veillez retirer l'opercule du flacon avant de sortir la poudre. Pour ce faire, retirez entièrement le bouchon du flacon, ôtez l'opercule et revissez complètement le bouchon du flacon.

- Vérifiez que le compartiment à poudre est parfaitement sec avant de le remplir. Il ne doit rester dans le compartiment aucune humidité résiduelle, par ex. restant d'une précédente préparation de traitement.
- Veillez absolument veiller à ne pas dépasser la hauteur maximale de remplissage du compartiment à poudre lorsque vous y mettez la poudre.
- Relevez entièrement le « culbuteur » ou fermez le flacon en vissant à fond. Pour limiter la formation de poussière en remplissant le compartiment, il est recommandé d'utiliser le « culbuteur » et de ne serrer que légèrement le flacon.

#### Conseil de traitement

Le patient et le dentiste doivent porter une protection oculaire adéquate, par ex. des lunettes de protection.

Le dentiste doit porter un équipement de protection adéquat sous forme d'un masque de protection et de gants de protection adaptés.

Utilisez une canule d'aspiration de brouillard de spray adaptée, par ex. la canule de prophylaxie Dürr Dental.

N'orientez pas directement la buse de projection sur la gencive au cours du traitement. La projection de jets directement sur les tissus mous peut endommager la gencive. Il existe par ailleurs un risque d'apparition d'un emphyseme sur les tissus et/ou d'une embolie en cas d'injection d'air dans la circulation sanguine.

Pour protéger les surfaces de peau sensibles, appliquez de la vaseline sur les lèvres du patient avant le début du traitement.

Une fois le traitement terminé, nettoyez le visage du patient avec une lingette jetable.

Cette poudre prophylactique ne peut pas servir à éliminer le tartre.

#### Informations générales

Cette poudre prophylactique n'a pas d'effet cariogène. Utilisez toujours une lingette pour enlever les résidus de poudre prophylactique qui restent sur les surfaces de travail, la façade des armoires ou le fauteuil.

#### Remarque pour le patient

Avertissez votre patient que le fait de boire ou de manger (thé, café ou tout autre aliment) dans les deux à trois heures qui suivent le traitement peut changer la couleur des dents.

#### Stockage et durée de conservation

Stockez à 25 °C maximum et dans un endroit bien ventilé. La durée de conservation est de 30 mois.

#### Composition

Trehalose, adjuvants

DÜRR DENTAL FRANCE, 8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France

☎ +33 155691150

DÜRR DENTAL BENELUX BVBA, Moldenheidebaan 97, 3191 Hever, Belgium

☎ +32 15616271

## IT Istruzioni d'uso

### Lunos® Polvere per la profilassi Perio Combi

Polvere per la profilassi Perio Combi (REF: CPZ640A1950)

**Avviso:** La polvere per la profilassi Perio Combi è un dispositivo medico. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'applicazione odontoiatrica professionale e può essere utilizzato solo da personale tecnico specializzato! La "polvere per la profilassi Perio Combi" è prevalentemente destinata all'applicazione sottogengivale e sopragengivale tramite l'utilizzo di sbiancatori in commercio. Prima di utilizzare la polvere per la profilassi, siete pregati di prestare attenzione alle istruzioni d'uso dello sbiancatore.

#### Applicazione

Il presente prodotto è raccomandato per:

- Rimozione del biofilm parodontale nell'ambito della terapia parodontale conservativa (recall), dopo la terapia iniziale, con una profondità di tasca sino a 10 mm.
- Pulizia di impianti e terapia delle periimplantiti a terapia iniziale avvenuta
- Delicata rimozione della placca nella zona del solco e nelle superfici dentali particolarmente sensibili.
- Rimozione di pigmentazioni lievi nella zona sopragengivale
- Rimozione della placca in apparecchi ortodontici (brackets)

#### Controindicazione

I pazienti affetti da malattie croniche alle vie respiratorie (ad esempio bronchite o asma) non devono essere sottoposti a trattamenti con sbiancatori, dato che la polvere contenuta nell'aerosol può comportare difficoltà respiratorie. Inoltre, occorre evitare l'applicazione sullo smalto non intatto e/o ipomineralizzato, nonché sulle macchie bianche.

Vogliate tenere in considerazione che il trattamento di tasche parodontali profonde può causare batteriemia. Pertanto, occorre prendere opportune misure prima di sottoporre al trattamento un paziente a rischio (pazienti affetti da endocardite, donne in gravidanza o in allattamento, persone con malattie contagiose, immunodeficienze, neutropenia, agranulocitosi, diabete, emofilia, pazienti sotto trattamento: pazienti sottoposti a radioterapia, chemioterapia e pazienti durante la terapia antibiotica).

Vogliate prestare attenzione a non rivolgere lo sbiancatore direttamente su protesi fisse e otturazioni, perché questo potrebbe danneggiare i restauri.

#### Procedura

- Si prega di eliminare i resti di polvere dall'apposito serbatoio dello sbiancatore, prima di procedere a riempirlo nuovamente con la polvere per la profilassi Perio Combi
- Agitare il flacone chiuso prima di prelevare la polvere per la profilassi Perio Combi.
- Rimuovere il sigillo del flacone, prima di prelevare la polvere. A tale scopo, rimuovere completamente il tappo del flacone, staccare il sigillo e riavvitare a fondo il tappo del flacone.

- Prima di procedere al riempimento del serbatoio della polvere, accertarsi che sia completamente asciutto. Nel serbatoio non deve essere presente alcuna umidità residua.
- Si prega di prestare attenzione a non superare il livello massimo di riempimento del serbatoio quando si carica la polvere.
- Ribaltare completamente la leva verso l'alto o svitare completamente il tappo del flacone. Per generare meno polvere possibile durante il riempimento del serbatoio, si consiglia di utilizzare la leva e di comprimere leggermente il flacone.

#### Consigli per il trattamento

Il paziente e l'operatore devono indossare un'adeguata protezione per gli occhi, ad esempio occhiali di protezione.

L'operatore deve indossare un'adeguata attrezzatura di protezione, come una mascherina che protegga bocca e naso e guanti di protezione adeguati.

Utilizzare una cannula di aspirazione di nube di aerosol adeguata, come ad esempio la cannula per la profilassi Dürr Dental.

Non indirizzare l'ugello dello sbiancatore direttamente sulla gengiva durante il trattamento. Un'esposizione diretta del tessuto molle può danneggiare la gengiva. Sussiste inoltre il rischio di formazione di enfisema nel tessuto e/o di un embolo, a causa dell'aria introdotta nella circolazione sanguigna.

Al fine di proteggere parti cutanee sensibili, siete pregati di applicare un velo di vaselina sulle labbra del paziente, prima di dare inizio al trattamento.

Una volta terminato il trattamento, pulire il viso del paziente con un panno monouso umido.

Con questa polvere per la profilassi non è possibile rimuovere il tartaro.

#### Informazioni generali

Questa polvere per la profilassi non ha effetto cariogeno. Utilizzare sempre un panno umido per rimuovere residui di polvere da superfici di lavoro, parti frontali di armadi o riuniti.

#### Avviso per i pazienti

Vogliate avvisare i Vostri pazienti che il consumo di cibo o bevande (tè, caffè o altri alimenti) nelle prime due - tre ore dopo il trattamento, può causare discromie ai denti.

#### Immagazzinaggio e durata

Conservare in luogo fresco e ben ventilato, a temperatura non superiore a 25° C. Il prodotto ha una durata di 30 mesi.

#### Composizione

Trealosio, eccipienti

DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l.

Via Dell'Artigianato n. 8, 20053 Muggiò (Mi), Italy ☎ +39 0395970300

## ES Instrucciones de uso

### Lunos® Polvo profiláctico Perio Combi

Polvo profiláctico Perio Combi (REF: CPZ640A1950)

**Atención:** Polvo profiláctico Perio Combi es un producto medicinal. Este producto ha sido desarrollado únicamente para la aplicación odontológica profesional y sólo debe ser utilizada por personal técnico especializado.

El "Polvo profiláctico Perio Combi" principalmente ha sido desarrollado para la aplicación sub- y supragingival con aparatos de aplicación de chorro de polvo comunes. Tener en cuenta las instrucciones para uso del aparato de chorro de polvo antes de usar el polvo profiláctico.

#### Aplicación

Este producto se recomienda para:

- Distancia de la biocapa parodontal en el marco de la terapia parodontal (terapia recall) tras terapia inicial realizada, con una profundidad de bolsa de hasta 10 mm.
- Limpieza de implantes, respectivamente terapia de periimplantitis tras terapia inicial realizada
- Eliminación cuidadosa de placa en sector gingival y en superficies dentales especialmente sensibles.
- Distancia a ligeras decoloraciones en la zona supragingival
- Para eliminar placa en aparatos ortopédicos de mandíbulas (Brackets)

#### Contraindicación

Pacientes que sufren de enfermedades crónicas de las vías respiratorias (p.ej. bronquitis o asma) no deben ser tratadas con un aparato de chorro de agua y polvo, debido a que el polvo que se encuentra en el aerosol puede causar dificultades en las vías respiratorias. Igualmente debe evitarse la aplicación en esmalte dental no intacto así como en esmalte hipomineralizado y "White Spots".

Tener en cuenta que el tratamiento de bolsas parodontales profundas puede causar bacteriemia. Por lo tanto es necesario tomar las medidas necesarias antes de iniciar el tratamiento de un paciente de riesgo (pacientes con endocarditis, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, personas con enfermedades contagiosas, problemas de inmunidad, neutropenia, angriulostosis, diabetes, hemofilia, pacientes bajo tratamiento: pacientes de terapia de radiación, de quimioterapia y pacientes durante una terapia antibiótica).

Tener en cuenta que el chorro del aparato de chorro de polvo no debe estar dirigido directamente en una prótesis dental o en rellenos, debido a que de esta manera se puede averiar restauraciones.

#### Proceso de trabajo

- Eliminar restos de polvo de la cámara de polvo del aparato de chorro de polvo antes de rellenarlo nuevamente con polvo profiláctico Perio Combi
- Agitar la botella cerrada antes de retirar el polvo profiláctico Perio Combi.
- Retirar el sello de la botella antes de utilizar el polvo. Retirar para este motivo la tapa de la botella por completo, retirar

el sello y atornillar nuevamente la tapa de la botella.

- Antes de llenar la cámara de polvo, tener siempre en cuenta que esté seca. En la cámara no debe haber humedad restante, p.ej. de medidas de preparación.
- Al momento de llenar el polvo en la cámara, tener siempre en cuenta de no exceder el nivel máximo de la cámara de polvo.
- Abrir la palanca por completo hacia arriba o desatornillar el cierre de la botella por completo. Para el desarrollo mínimo del polvo al momento de llenar la cámara, se recomienda utilizar para ello la palanca y comprimir ligeramente la botella.

#### Recomendaciones de tratamiento

El paciente y la persona que realice el tratamiento siempre deben usar protección ocular adecuada, p.ej. gafas de protección.

La persona que realice el tratamiento debe utilizar un equipo de protección personal adecuado en forma de una mascarilla para la boca y la nariz así como cuantes de protección adecuados.

Utilizar una cánula de aspiración de niebla de spray adecuada, p.ej. la cánula Dürr Dental Prophylaxe.

No dirigir la boquilla del chorro directamente a la encía durante el tratamiento. La aplicación del chorro directo en tejido suave puede causar un daño en la encía. Adicionalmente se corre el peligro de la formación de un enfisema en el tejido y/o una embolia por aire que ingresa al circuito sanguíneo.

Para proteger partes sensibles de la piel, aplicar vaselina en los labios del paciente antes de iniciar con el tratamiento.

Una vez finalizado el tratamiento, limpiar la cara del paciente con un paño desechable húmedo.

Con este polvo profiláctico no es posible eliminar el sarro dental.

#### Informaciones generales

Este polvo profiláctico no tiene efecto cariogeno. Utilizar siempre un paño húmedo para retirar restos de polvo profiláctico de superficies de trabajo, frentes de armarios o asientos de tratamiento.

#### Indicación para los pacientes

Indicar siempre a los pacientes que el consumo de comidas o de bebidas (té, café u otros alimentos) en las primeras dos a tres horas después del tratamiento puede causar descoloraciones de los dientes.

#### Almacenamiento y durabilidad

No almacenarlos en lugares sobre los 25 °C y guardarlos en un lugar bien ventilado. La durabilidad es de 30 meses.

#### Composición

Trealosa, medios auxiliares

DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A., Serra de la Salut, 11 N-6, Polígono Industrial  
Santiga, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335